



અદ્ય કાર્યક્રમાંબદ્ધ..

ପ୍ରଭା, ସୁହୃଦି, ସୁରଭି ଥାବା
ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଳବାୟୁ ଲାଗି
ଉପସ୍ଥିତ । ୧ ଏକର ଜମିପାଇଁ
୨-ଗୁଣଶାଲ ଅଦାଖଣ୍ଡ ଦରକାର
ହୁଏ । ଏହି ଅଦାଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ୨-ଶତି
ଆଖି ଥାଇ ୧୫ରୁ ୧୯ ଗ୍ରାମ ଓଜନ
ରଖି କାଟନ୍ତୁ । ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅଦା
ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ୧୦ଲିଟର ପାଣିରେ
୪୦ ଗ୍ରାମ ମାଙ୍କୋଜେବ ରୁଣ୍ଡ, ୧୦

ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଟାଜିମ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ୪ ମିଲିମିଟ୍‌
ମାଲାଥୁଅନ ଆଷଧ ଗୋଲେଇ ସେଥିରେ
ପ୍ରାୟ ୪୦ କିଗ୍ରା ଅଦାଖଣ୍ଡ ବିଶୋଧନ
କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଅଦାଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ
ଛାଇରେ ଶୁଙ୍ଖାକୁ ତେବେ ଶେଷ ୦୭
ଟାକ ବେଳେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୨ ଗାତ୍ର
(୩ ଟଙ୍କ) ଓ ଅଦାଖଣ୍ଡ ଲଗା ହେବା
ପରେ ସିଆର ଏବଂ ପଟାଳିରେ ୧୨
ଗାତ୍ର ଗୋବର ଖତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକର ପ୍ରତି

୪୦ କିନ୍ତୁ ଯବନ୍ଧାରଜାନ, ୪୦ କିନ୍ତୁ
ପଥପରସ ଓ ୪୦ କିନ୍ତୁ ପଶାସ ଟି
ଥରରେ ଦିଆନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ସମ୍ବନ୍ଧ
୪୦ କିନ୍ତୁ ସୁପର ଫସଫେର ଓ ୪୦
ମୁୟରିଗ୍ର ଅପ୍ ପଶାସ ଦିଆଯା
ଅଦା ଲଗାନ୍ତୁ ପଶାଳିରେ ମୂଳସା
ଭଲ ଭାବରେ ମାଟିର ମିଶେଇ
ପରେ ଅଦାଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କ
ଲଗାନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର


ଖଣ୍ଡର ଦୂରତା ଅନ୍ୟ ଅଦା
ଖଣ୍ଡଠାରୁ ୨୪ ସେମି ରହିବା
ଦରକାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଦା
ଖଣ୍ଡ ୪ ସେମି ଗଭାରରେ
ଲଗାନ୍ତୁ । ଅଦା ଲଗାଇବା
ପରେ ପାଗଳିକୁ ଶୁଷ୍ଟିଲା
ନତା, ତଳପତ୍ର ବା ଘାସ
(ମଚଳିଙ୍ଗ) ଦ୍ଵାରା ଦୂର ଜଞ୍ଚ
ବହଳରେ ଗୋତେଇ ଦିଆନ୍ତୁ ।

ଏବୁଦ୍ଧ ସାର

କାନ୍ତିକ ବିଜୟଶ ଚାଷ



ଡ'. ପଟ୍ଟରତ୍ନ କୁହାର ପଣ୍ଡା



ବା ଜୀଗରାର ଗାହିଦା ବଞ୍ଚିଯାରା ଥାଏ ।
ଏହାର ରଙ୍ଗ ଓ ଆକାର ଭିନ୍ନ
ହୋଇଥାଏ । ରାତ୍ୟର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ
ଏହାର ଗାଷ ହୋଇଥାଏ । ନିରିଡ଼ା,
ଉର୍ବର ଓ ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟିରେ
ଏହାର ଗାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଉନ୍ନତ
ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କିସମ ମଧ୍ୟରେ ଉଛୁଳ
ମାଧୁରୀ, ଉଛୁଳ ତାରିଣୀ, ଉଛୁଳ ଜ୍ୟୋତି,
ଉଛୁଳ କେଶରା, ଉଛୁଳ ଅନୁତ୍ତୀ, ପନ୍ତ
ରତ୍ନାରାଜ, ପନ୍ତ ସମ୍ବାଦ, ପୁରୀ ପରପଲ
ଲଙ୍କୀ, ପୁଷ୍ଟା ପରପଲ ରାତ୍ରିକୁ ଛାଡ଼ି
ଅନେକ କିସମ ରହିଛି । ସଙ୍କର ବାଇଗଣ
ପାଇଁ ଖୁବି ଖୁବି କିମ୍ବାପା ।

ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ (କିସମ) ୩
 ୭୦ ଗ୍ରାମ (ସଙ୍କର) ବିହୁନ ଦରକାର।
 ବର୍ଷାଫିଲେ ଚାଷ ପାଇଁ ମେ-ଜୁନ ମାସ ତଳି
 ପକାଇବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ବିଶୋଧିତ
 ବିହୁନ କୁଣ୍ଡରେ ତୁମ୍ଭି ୪-୫ ସପ୍ତାହରେ
 ପ୍ରାୟ ୧୨ ସେ.ମି. ଲମ୍ବର ଚାରାହୁଡ଼ିକୁ
 ୧୦-୧୫ସେ.ମି. ଦୂରତା ରଖି ଲଗାନ୍ତୁ।
 ଏକର ପ୍ରତି ୮୦ କୁଇଖାଲ ଶତା ଖତ
 ସହ ଏନ୍.ସି.କେ. ୪୦:୩୦:୧୦ କି.ଗ୍ରା
 (ଆର୍ଥିକ ମି ଏ ମି ଗ୍ରେନ୍‌ବାନ୍ ପରିଆ)



ମୂଳସାରଭାବେ ସ୍ଵର୍ଗ ଖତ ସହିତ ସମୁଦ୍ରାଯନ
ଡି.ଏ.ପି. ସାର ଓ ଅଧା ପଚାସ ସାର
ଦିଆକୁ ରୁଆ ହେବାର ୨ ସପ୍ତାହ ୩
୪ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଯୁକ୍ତିଆର ଅଧା ଓ
ପଚାସର ଏକ ଚର୍ବୀଶାଶକୁ ମୂଳତାରୁ ଚିକେ
ଜାହି ପମୋର ଜାହି ମାନି ଚିଲେଖି।

ଲିଟର ଓଦା ମାଟି ଉପରେ ୨୦୦ ଲିଟର
ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଅପରାହ୍ନରେ ସିଞ୍ଚନ
କରନ୍ତୁ । ଗୋଇବା ପରେ ହାଲୁକା ଜଳ
ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ମାଟିର ବତର
ଦେଖୁ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ
ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିଷା ଯୋକ ।
ଗୋଇବାର ଠିକ୍ ପର୍ବତ ଏକର ପଢ଼ି

ଏକର ପ୍ରତି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଏହି
ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ପିଯାଏ ।
ଆକ୍ରମ ଭାଳ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ କାଟି
ମାଟିରେ ପୋଡ଼ି ଦେବା ଭଲ । ନଚେତ
ମୁଢାଲୋଚନ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ, ଲ.ସି ୧୦
ମି.ଲି/ ଫୁକେଣ୍ଟିଆମାଇତ ୩୪ ପ୍ରତିଶତ,
ଏମ.ୱେମ.ର ୪ ମିଲି/କୋରାଣ୍ଡ୍ ନିଲି

ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୋଟାଇୟ କଣ୍ଠରତ୍ନା

ତିଙ୍ଗରାଣୀ ଏକ ଡାଲିଜାଡ଼ୀୟ ଫଟାଲା ପାହାଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚ ବା ଉଚ୍ଚ ଜନ୍ମିର ଏହାର ବସୁଳ ଚାଷ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଡଙ୍ଗରାଣୀ କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କଟିଙ୍ଗ ବା ରାଜସବିନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏକ ବିଧି ଉପକାରୀ ଫଟାଲ ଭାବେ ଏହାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ । ଛୁଲ୍ଲ ଜାତୀୟ ଫଟାଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଏକର ପ୍ରତି ଟ କିଲୋ ପଦକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ କରିପାରେ । ସବୁଜ ଗୋଖାବ୍ୟ ବ୍ୟତିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ସବୁଜଥାର ତଥା ଆଛାଦିତ ଫଟାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ବିଳମ୍ବରେ ପୁଲ ଧୂଥିବା କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡିକ ୨ ମାସର ହୋଇଗଲେ ମୂଳରୁ ଟ ଲଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି କାଟି ଅମଳ କଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦ରୁ



୩୧

କୁଣ୍ଡପୁରକାନ୍ତ ଓ କୁଣ୍ଡକା ଉପାଦାନ



