





















# ଅଂଶୁଳାତଃ ଏବେଠୁ ଫୁଥ୍ରୁ ସତକୀ



ଅଂସୁମାତ ପାଇଁ ସର୍କର ଓ ସାବଧାନ ଦୁଇଛି ।  
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଆନ୍ତି । ଗୁହାଳକୁ  
ଥଣ୍ଡା ରଖାଯା ସହିତ ସଙ୍କଳ ଜାଗାଯ ଗାଇ  
ଓ ମଳିଶି ଦିନରେ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର  
ଗାଧୋଇ ଦିଆନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟରେ ୩୦ ଗ୍ରାମ ଖଣିକ  
ଲବନ ମିଶାଯାଇପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଆନ୍ତି ।  
ଦିନ ୧୦ଟା ପରେ ଗୋରୁଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଚିବା

ପାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ । କୁନ୍ତ ମାସରେ ବର୍ଷା ଆସିଯିବ  
ଓ ବର୍ଷାରତ୍ତୁରେ ସାହାଶ ଓ ବଜବଜିଆ ଗୋଟି  
ଅଧିକ ଛୁଏ । ତେଣୁ ବର୍ଷାରତ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିଲ  
ମାସରେ ସମୟ ଗାଇ, ବଳଦ ଓ ମରାଙ୍କିଲୁ ପ୍ରାଣୀ  
ଟକ୍କିସକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସାହାଶ, ବଜବଜିଆ  
ଓ ପାଞ୍ଚାମ୍ବ ଗୋଟାର କିକା ଦିଅନ୍ତି । ଦାନାକୁ ଯଥା  
ସମ୍ବନ୍ଧ ସାନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ।

ଏହି ସମୟରେ ଛେଳି ଓ ମୋଖାକୁ ଥଣ୍ଡା  
ପରିଦେଶରେ ରଖନ୍ତି । ଦିନ ୧୦ଟା ପରେ  
ପଡ଼ିଆକୁ ଚରିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଥେଷ୍ଟ  
ପରିମାଣର ପିଲବା ପାଣି ଯେଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।  
ପି.ପି.ଆର. ଟିକା, ଏଷାରୋଟକ୍ଷେମିଆ  
ଓ ଛେଳି ବହସ ଟିକା ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ  
ଦିନ ୫ ରୁ ୧୦ ଗ୍ରାମ ଖଣିକ ଲବଣ ମିଶ୍ରଣ  
ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଛେଳି ଓ ମୋଖାମାନେ  
ଦିନସାରା ଚରିଲେ ମଧ୍ୟ ମେ ମାସରେ  
ଯଥେଷ୍ଟ ଘାସ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ପ୍ରତି  
ଛେଳି ବା ମୋଖାକୁ ଓଜନ ହିସାବରେ ଏହି  
ମାସରେ ଦିନକୁ ୧୦୦ରୁ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଦାନା  
ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

# ଆଦ୍ୟ—ହଳଦୀ ଲଗାଉଥିଲେ...



ବର୍ଷାମାନ ଅଦା ଓ ହଳଦୀ ଲଗାଇବାର  
ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୟ । ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଦା  
ଓ ହଳଦୀ ଲଗାନ୍ତୁ । ଅନୁମୋଦିତ ଅଦା  
କିସମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - ସୁରତି, ସୁରତି,  
ସୁପ୍ରଭା । ଅଦା ଚାଷ ପାଇଁ ହେବୁର ପ୍ରତି  
୧୫ରୁ ୧୭ କୁଳଶାଲ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ।  
ଅନୁମୋଦିତ ହଳଦୀ କିସମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା -  
ରଙ୍ଗ, ସୁରମା, ରୋମା, ରନ୍ଧି । ହଳଦୀ ଚାଷ  
ପାଇଁ ହେବୁର ପ୍ରତି ୧୦ରୁ ୧୫ କୁଳଶାଲ  
ବିହନ ଦରକାର । ଏକ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଓ  
୩୦ ସେ.ମୀ. ଉଚ୍ଚର ପଚାଳି କରାଯାଏ ।  
ଦୁଇ ପଚାଳି ମଞ୍ଚିରେ ୩୦ ସେ.ମୀ. ଜଳ  
ନିଷାସନ ନାଲି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଉଚ୍ଚ  
ପଚାଳି ଯୋଗୁ ଜଳ ନିଷାସନ ସୁବିଧାଜନକ

# ଅନ୍ତର୍ମାର...

➤ ଖାରଦିନିଆ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ  
ଶସ୍ତ୍ରଯାତ୍ରାୟ ଫର୍ମାଲ ଯଥା ମକା ଓ  
ବାଜରା ଏବଂ ଡାଲିଙ୍ଗାତ୍ରାୟ ଫର୍ମାଲ  
ବରଗୁଡ଼ି ଓ ଉଙ୍ଗର ରାଣୀ ଚାଷ  
କରନ୍ତୁ। ସବୁଦିନିଆ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଫର୍ମାଲ  
ଯଥା ସଙ୍କର ନେପିଆର ବାଜରା  
ଓ ଗିନି ଘାସରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୭  
କିମ୍ବା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି  
ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ।

➤ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ମୁଲା ରୋଗର ନିଯନ୍ତ୍ରଣ  
ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ୭ ଦିନ ଭିତରେ  
ଲାଘୋଗା ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଏବଂ  
୧୩-୧୪ ଦିନ ଭିତରେ ଆଇବିଟି  
ଟିକା ଆଖିରେ ପକାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା  
କରନ୍ତୁ।

➤ ବନରାଜ ଓ ଗ୍ରାମପ୍ରିୟ କୁକୁଡ଼ା  
ପାଳନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ



# ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଅମ୍ବାଳି ଏବଂ ପରିବହନ ଯୁଗ

ତାଳୁଆ ଧାନର ଶତକଡ଼ା ୮୦ୟ  
 ୮୪ ଭାଗ କେଣ୍ଠା ପାଚିଆଇଥିଲେ  
 ଧାନ କାଟି ଦିଅନ୍ତା  
 ଧାନ କାଟିବା ପୂର୍ବ ଶେଷ ଥର  
 ପାଇଁ ବିଲରେ ଥିବା ମିଶା ଧାନ  
 କାଟି ଦିଅନ୍ତା ୫୨୦ ପାଇଁବା

ଗୁରୁ ଗ୍ରା ଭାଗ ପାକଳ ହୋଇଥିଲେ  
ଅମଳ କରିଦିଅଛୁ ଅମଳ ପରେ ମଞ୍ଜୁନ୍ତି  
ଭଲ ଭାବରେ ଖାରାରେ ଶୁଣାଇ ସାଙ୍ଗି  
ରଖିଛୁ ଖାରାଟିଆ ବିରି ଓ ପୁଗ ଫୁଲ ଫଳ  
ଅବସ୍ଥାରେ ଥୁଲେ ହାଲୁକା ଜଳସେନ  
ଦୂର ।

ପବନ ଯିବା ଆସିବାର ସୁଖିଧା କରଇ  
ସକ୍ଷମିତ ଦାନା ତଥା ନିର୍ମଳ ଥଣ୍ଡା ପା  
ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତର୍ଗତ  
ଦିନକୁ ୨ୟ ମା ଥର ପାଣି ବଦଳାଇ  
ଦିନ ୧୧ଗାରୁ ଛର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଳୁ  
ମହ ମାତ୍ରରେ ଡାକ୍ତାର୍ଯ୍ୟ ପାଶକି କରି

| । ମାସରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସବୁ କୁହୁଡ଼ାଙ୍କୁ  
| ଆର୍ଗୁବି. ଚିକା ଦିଆନ୍ତୁ।

| । **ମାଛିଗାଷ :** ପୋଖରୀର ପାଣି ସ୍ରର  
| କମିଗାଲେ ପାଣି ଭର୍ବି କରନ୍ତୁ । ଏକ  
| ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ମାଛିଗାଷ ପୋଖରୀଟେ  
| ମରୋଟି ଦିନ ଗାନ୍ଧି ପାଇଁ ଥିଲା

କାଣ୍ଡିଆକୁଣ୍ଡା ଓ ଶ କି.ଗ୍ରା. ୪୦୦  
ଗ୍ରାମ ଚିନାବାଦାମ ପିତିଆ ମିଶଣକୁ  
ପୋଖରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି।  
ବର୍ଷକିଆ ଯାଆଂକ ଚାଷ ପାଇଁ  
ଆଗ୍ରହୀ ଚାଷାମାନେ ପୋଖରାକୁ

ଶୁଣାଇ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ  
କରିଦିଆନ୍ତୁ ।  
ଖରାଟିଆ ଗାଷ ସମୟରେ :  
ଖରାନିଆ ବର୍ଷାର ସହୃଦୟାଗ  
କରି ମାଟି ବତର ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ

ଜମିକୁ ୨-୩ ଡକ୍ଟର ଖାରାଟିଆ  
ଚାଷ କରିଛୁ। ଏହାହାରା  
ଅନିଷ୍ଟକାରୀ କାଟର ଶୁକ ଓ ଅଣା  
ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମାଟିର  
ଜଳଧାରଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପାଏ।  
ଜମିରେ ଫସଲ ନ ଥାବା ଅବସ୍ଥାରେ  
ନମୁନା ମାଟି ସଂପ୍ରଦୟ କରି  
ପରାକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦିଅଛୁ।  
ମାଟି ପରାକ୍ଷା କରି ଅନୁମୋଦିତ  
ଖତ ଓ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ।  
ବୁଆଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ସବୁଜ  
ସାର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟରେ ମୋ ଦ୍ଵିତୀୟ  
ପକ୍ଷରେ ହେଲୁଗ ପିଲା ୨୫ କି.ଗ୍ରା.  
ହିମାରରେ ଧର୍ମିଯା ବିଦ୍ୟୁତ ଛାନ୍ଦି।

-କୃଷି ବୈଷୟିକ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର,  
ସଂପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ,

# ବ୍ୟାପିକାରି...

ରାଶି ଫୁଲରେ ପତ୍ର ବିକ୍ଷା ପୋକ  
ଲାଗିଲେ: ରାଶି ଫୁଲରେ ମୁଳ ଧରିବା  
ଓ ଫୁଲ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଜଳସେବନ  
କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରମୋଡ଼ା ଓ ଫୁଲବିକ୍ଷା  
ପୋକ ଲାଗିଲେ ପ୍ରତି ଲିଙ୍ଗର ପାଣିରେ ୨  
ମି.ଲି. ପ୍ରାଚେନୋପସ୍ଥ କିମ୍ ୨ ମି.ଲି.  
କ୍ଲୋରପାଇଟିପସ୍ ୨୦ ଇ.ସି. ମିଶାଇ  
ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ତଳପତ୍ରାରୁ ଉପରକୁ  
ପଡ଼ୁଛିକ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଆସିଲେ ବା  
ଫୁଲ ଶୁଖୁ ଆସିଲେ ରାଶି ଅମଳ କରନ୍ତୁ ।  
ଚିନାବାଦାମ : ଚିନାବାଦାମ ଫୁଲ  
ପାକଳ ହୋଇ ଅମଳ ଅବସ୍ଥାକୁ  
ଆସିଯାଇଥିଲେ ହାଲକା ଜଳସେବନ

ମି.ଲ୍. ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ  
ପତ୍ରଚିତ୍ର ଗୋଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି  
ରାସାୟନିକ ସିଞ୍ଚନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ  
ହୋଇପାରିବ । ଫୁଲଶଢ଼ା ଗୋଟି  
ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ  
ଖାଇଯାଇବାକୁ ମିଥାଇଲ୍ ୧.୫ ଗ୍ରାମ  
ଆଯୋଧ୍ୟାନେଟ ମିଥାଇଲ୍ ୧.୫ ଗ୍ରାମ

ଧ୍ୟାନ ବଦଳରେ ଅଶିଖାନ ଫେସଲ ଯଥ  
ମକା-ବରଗୁଡ଼ି,ହରତ,ବିରି,ମାଣ୍ଡିଆ,  
ଚିନ୍ମାରାଦାମ, ଜଡ଼ା ଓ କନ୍ଦମୂଳ ଲଜ୍ଜାଦୀ  
ଗାଷ କରନ୍ତୁ । ମହୁଡ଼ି ସହଣୀ ଥୁବ  
ଗଭାର ରେର, ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ଵର୍ଗ ଅବଧି  
କିମ୍ବାପି ନିର୍ବିକାର କରନ୍ତୁ । ଫେସଲର  
ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳଯେବନ ପାଇଁ  
ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ  
ଗଭାରିଆ ଜମିରେ ଗଭାରିର ବିପରାତ  
ଦିଗରେ ହୁଡ଼ା ଓ ନାଳ ଅନ୍ଦଳବଦଳରେ  
କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ବାରା ମାଟିରେ ଅଧିକ  
ବର୍ଷା ପାଣି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇରହିବ  
ଖରାଟିଆ ଗାଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ  
ଏହାଦ୍ଵାରା ରୋଗପୋକ ଓ ଘାସ  
ଦ୍ୱାରା ପାପାରିଛି ୫୦୦ ହେଲା



# ଅଣ୍ଡାର ତାଙ୍କ କରୁଥିଲେ...

ଧ୍ୟାନ ବଦଳରେ ଅଶାନ ଫ୍ରେଲ ମଧ୍ୟ  
ମକା—ବରଗୁଡ଼ି, ହରତ, ବିର, ମାଣ୍ଡିଆ,  
ଚିନାବାଦାମ, ଜଭା ଓ କଞ୍ଚମୁଳ ଲେଖାଦି  
ଗାଷ କରନ୍ତୁ । ମରୁଡ଼ି ସହଶି ଥୁବ  
ଗଭୀରରେର, ଶାସ୍ତ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଓ ସ୍ଵର୍ଗ ଅବଧି  
କିସମ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତୁ । ଫ୍ରେଲରେ  
ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳଯେବନ ପାଇଁ  
ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ସଞ୍ଚଯ କରି ରଖନ୍ତୁ  
ଗଭୀରିଆ ଜାରିରେ ଗଭୀରିର ବିପରାତ  
ଦିଗରେ ହୁଡ଼ା ଓ ନାଳ ଅଦଳବଦଳରେ  
କରନ୍ତୁ ଯମ୍ବାରା ମାଟିରେ ଅଧିକ  
ବର୍ଷା ପାଣି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇରହିବ  
ଖରିଆ ଗାଷ ନିଷ୍ଠିତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ  
ଏହାବାରା ରୋଗପୋକ ଓ ଘାର  
ଦିନ ଦୋଷାବାହି ଏହି ଫ୍ରେଲ

ଶୀଘ୍ର ବୁଣ୍ଡା ଯାଇପାରିବ । ଅମ୍ବ ମାଟିରେ ଚୂନ୍ମ  
କାଗଜକଳ ମଇଲା ଇତ୍ୟାଦି ମୃତ୍ତିକା ସଂଶୋଧନ  
ବ୍ୟବସ୍ଥାର କରନ୍ତୁ । ଫଳତେ ଜମିରେ ଘାସ କରି  
ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକ ଜଳ ହର୍ଷିତ ହୁଏ ଓ ଅମନ୍ତର  
ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଏକକ ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ  
ମୃତ୍ତିତ ବା ଅନ୍ତଃଫସଲ ଚାଷ କରନ୍ତୁ । ଡିମ୍ବ  
ଜମିରୁତ୍ତିକରେ କେବଳ ଧାନ ନ କରି ଅନ୍ତଃ  
ଫସଲ ଯଥା-ମୁଗ, ବିରି, ହରତ, ମାଣ୍ଡିଆ  
ମକା ଆଦି ଫସଲ ଅନ୍ତଃଫସଲ ହ୍ୟାବଦରେ  
ନିଆୟାଇପାରେ । ବୁଣ୍ଡାବେଳେ ନାଲିରେ ଖାଦ୍ୟ  
ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ମରୁତ୍ତ ସହି ପାରୁଥିବା ଧାରା  
କିସମ ଯଥା-ଅନିଦା, ପଥରା, ଯୋଗେଶ  
ଖଣ୍ଡଗିରି, କଳିଙ୍ଗ-୩, ହାରା, ବନ୍ଦନା ଇତ୍ୟାବ୍ୟ  
ବ୍ୟବସ୍ଥାର କରନ୍ତୁ ।

