

ପୃଷ୍ଠା-୮+୮

ଧରିତ୍ରୀ

DHARITRI

ବ୍ରଜପୁର, ବୁଧବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୩/୨୦୨୨ (୮+୮=୧୬ ପୃଷ୍ଠା)

୧୮ ଶ ଭାଗ ୫୫ ସଂଖ୍ୟା

www.orissakhabar.com/www.dharitri.com | Printed at Bhubaneswar, Sambalpur, Angul and Rayagada

Berhampur, Wednesday, March 23/2022 Page 16 ₹ 7.00

★★★

ମୂଲ୍ୟ ୯୭



Safal

PAN MASALA

କିଛି ଅତୁଳ୍ୟ ସ୍ଵାଦ
ଶବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛୁ ନାହିଁ



ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ପାନ କିମ୍ବା ପାନ ମସଲା ଛେପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ।
ସଫଳ ପାନ ମସଲା ଦ୍ଵାରା ଜନହିତରେ ଜାରି ।

0% TOBACCO • NICOTINE NOT ADDED • NOT FOR MINORS

ବୈଧାନିକ ଚେତାବନୀ: ପାନ ମସଲା ଚୋବାଇବା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ

ପଂକ୍ତାଷ୍ଟରେ ଉଚ୍ଚ ଦମନ

A photograph showing a branch of a mango tree. The branch is densely covered with numerous green, oval-shaped mangoes at various stages of ripeness. The leaves of the tree are visible in the background, creating a lush green canopy.




ସୋରିଷରେ ଜଉପୋକ ଲାଗିଲେ..

ସୋରିଷ ଫଂସଲରେ ଜଗାପକ ଦମନ ପାଇଁ ହେବୁର ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ମି.ଲି. ଡାଇମିଥୋଏବର ୩୦ ଲ୍.ସି. କିମ୍ବା ଲମିଟାକୋପ୍ରିଭ ୧୭.୮ ଏସ୍.ୱଲ୍. ୧୯୪ ମି.ଲି. ବା ଆୟୋମିଥୋକଜାମ ୧୫ ଏସଜି-୧୯୪ ଗ୍ରାମକୁ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଉପରବେଳା ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। କରତିଆ ମାଛି/ପ୍ରତ୍ୱଦୀ ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ହେବୁର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମିଲିଲିଟର ଲଥୋଫେନସ୍ପ୍ରେସ୍ ୧୦ ଲ୍.ସି. କିମ୍ବା ୪୦୦ ମି.ଲି. ଲଞ୍ଛାକାର୍ବ ୧୪.୪% ଲ୍.ସି. ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଏହି ଜାଷରେ ପତ୍ରିତା ଦାରୀ ଦେଖାଦେଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ହେବୁର ପ୍ରତି ୧.୪ କି.ଗ୍ରା. କପର ଅନ୍ତିକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ୧.୪ କି.ଗ୍ରା. ମାଙ୍କୋକ୍ଷେତ୍ରକୁ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।



ଡାଲିକାଟୀୟ ବିହନ ବିଶୋଧନ

A collage of various grains and legumes, including rice, beans, lentils, and sunflower seeds, illustrating the types of food items mentioned in the text.



ଆଶ୍ରୁ କାଟିବା ସମୟରେ..



A black and white portrait of Prof. Sudobodha Kumar Sahoo, a man wearing glasses and a light-colored shirt, standing outdoors near a beach.

ଆଖୁ କାଟିବା ବେଳେ ଆଖୁଖଣ୍ଡକୁ ତଳି ପକାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଳିଥର ମୁଣିରେ ଚାରା ଉତାରନ୍ତୁ ମୁଳି ଆଖୁଲୁ ବୋଗମୁନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଖୁଅ କାଟିବା ପରେ ହେଲା ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଷ୍ଣଜିମ୍ ବା ଥାଯୋପାନେର ମିଥାଇଲ୍ (୩୪୦ ଗ୍ରାମ) ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂନ କରନ୍ତୁ । ଆଖୁଗଛନ୍ତୁ ଏକ ଧାରୁଆ କରୁଗିରେ ଭୂମି ପରନ ସବେ ସମାନ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଖୁ ଅଧିକ ଅମଳ ଝୁଣ୍ଡ ଓ ମୂଳିଆଖୁ ଫେଲାଇ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗଜା ବାହାରେ । ଜମିରୁ ଶୁଖୁଲା ପତ୍ର ବାହାରକରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିଷାର କରନ୍ତୁ । ଆଖୁ ଫେଲାଇରେ ଶର୍କତା ଅଂଶ ହାତ ବ୍ରିକ୍ଷ ମିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ବ୍ରିକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ୧୮ ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆଖୁ କାଟିବା ଉଚିତ । ଆଖୁ ଖୁଅକୁ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଚାଷକରି ହୁଢ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଫଳରେ ପୁଣ୍ଡା ତେର ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଦୂଆ ଚେର ବାହାରି ଆଖୁକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ମାଟି ଅଧିକ ଶୁଖୁଯାଇଥିଲେ ଜଳସେଚନ କରି ହୁଢ଼ା ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ । ହୁଢ଼ା ଭାଙ୍ଗିଲା ସମୟରେ ହେଲକୁ ପ୍ରତି ୧୦ଟନ ଗୋବରଖତ, ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ଫେଲାଇରେ ଓ ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ପଗାସ ସାର ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଧାଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଗଛକୁ ଗଛ ବ୍ୟବଧାନ ୪୫ ସେ.ମି.ରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ହୁଢ଼ା ଭାଙ୍ଗିବାର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଖୁଅ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ପନ୍ଦିପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲେ...



ସମୟ ପ୍ରକାର କଖାରୁ ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ଯଥା କଖାରୁ କାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଛଞ୍ଚି, ଲାଉ, କଳରା, ତରଭୁଜ ଲୟାଦିନ୍ଦୁ ଜମିରେ ଲଗାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦାରେ ୨-୩ ଟି ସ୍ଵପ୍ନ ସବଳ ଗଛ ରଖି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାରା ଉପାଦି ଦିଅନ୍ତା ଭାନୁତ କିମନ ବା ସଙ୍କର ଜାତୀୟ ଭେଣ୍ଟି ମଞ୍ଜି ଲଗାନ୍ତି ଜମିକୁ ଭଲଭାବରେ ଚାଷକରି ଶାଗଜାତୀୟ ଫ୍ରେସଲ ଲଗାନ୍ତି । ସବୁ ସମୟରେ ଶାଗଜାତୀୟ ଫ୍ରେସଲରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଷ୍କଲା ଶଢ଼ି ଗୋବରଣତ ବା ଜିଆଖତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଜମିର ମାଟି ପରାକ୍ଷାକରି ଅନୁମୋଦିତ ହିସାବରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ବାଜଗଣା ଗଛରେ ଢାଳ ଓ ଫଳ ବିଶାପୋକ ଲାଗିଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୭୦୦ ଗ୍ରାମ ଫେମ୍ (ଫ୍ରେସରିଆମାଇତ) ବା ୮୦୦ ଗ୍ରାମ କାର୍ଟାଘ ହାଲତ୍ରୋକ୍ତାବାଜିତ ୪୦ ତାର ସେତିତ ଶୁଷ୍କ ଆଷଧକୁ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଖରାଦିନିଆ ଭେଣ୍ଟି, ଜଞ୍ଚି, କଖାରୁ, ପୋଟଳ, କାଙ୍କଡ଼, କଳରା, କାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଲାଉ, ବାଜଗଣା ଲଗାନ୍ତି । ଖନ୍ତି ଲେଉଛିଆ ଯୋଳ ଆଦି ଶାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଜିବିବା ମାର୍ଗ ଏହା ମନ୍ତ୍ର ମମମ୍ ।

➤ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଛାଇରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ
ପରିଷାର ପାଣି ପିଲବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଦୁଧଆଳି ଓ ଗର୍ଜବତୀ ଗାଇଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସହ ହାତ ଗ୍ରାମ ରୁ ୪୦
ଗ୍ରାମ ଖଣିକ ଲବଣ ମିଶନ ନିଶ୍ଚୟ

ଦିଅନ୍ତୁ ।
 ► ମାର୍ଜ ମାସ ଦେଲକୁ ବିନା ବର୍ଷାରେ
 ଚରିବା ପାଇଁ ଘାସ ଯଥେଷ୍ଟ ମିଳେ
 ନାହିଁ । ତେଣୁ ଛେଳି ଓ ମେଘାମାନଙ୍କୁ
 ଚରି ଆସିଲା ପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଡାଳପତ୍ର
 କାଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ଓ ଛେଳି
 ବା ମେଘା ପିଣ୍ଡା ଦେବିନିକ ଧୀର୍ଦ୍ଧନୀ ୧୦୦ରୁ ୨୦୦
 ଗ୍ରାମ ସହୃଦୀତ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ
 ସେମାନେ ଅଧିକ ଓଜନର ହୁଅନ୍ତି ।
 ► ବର୍ଷମାନ କୁକୁଡ଼ା ଗୃହର ଉଚିତ
 ଉଭାପ ଦିନରେ ପାଖାପାଖୁ ୩୫୦ ରୁ
 ୪୦୦ ସେଲ୍‌ସିଯେସ୍ ରହୁଥିଲେ କୁକୁଡ଼ା
 ଚିଆଁ ପାଳନ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ
 ଉଭାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୃହର
 ଝରକାରେ ଓଦା ଅଖା ଓହଳାଇବା
 ବ୍ୟକ୍ତିମା କରନ୍ତି । ବିଶ ଆରେକେମ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ ଓ ଜୀବନ କାଣ୍ଡ



ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଚିତ । କାରଣ
ଏହି ସମୟରେ ଦିନକୁ ଶ୍ଵେତ ଜିସମ
ଧାନରୁ ଓ ଗୁଣ ମିଳିମିଟର ଏବଂ
ମଧ୍ୟମ କିସମ ଧାନରୁ ୧୦ ରୁ ୧୫
ମିଳିମିଟର ପାଣି ପ୍ରସବନ ଦ୍ୱାରା ବା
ଆକାରରେ ଚାଲିଯାଏ । ସେହିପରି
ସୂର୍ଯ୍ୟଚାପ ଯୋଗୁ ଧାନକ୍ଷେତରରୁ ଦିନ
ମା ରୁ ଏ ମିଳିମିଟର ପାଣି ବାସ୍ତାକଟ
ଏବଂ ମାରିବ ବଢ଼ର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ୧.
ରୁ ୧.୮ ମିଳିମିଟର ପାଣି ଅଶ୍ରୁବଣ
ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଜଳର ଏପରି
ନଷ୍ଟକୁ ପୂରଣ ପାଇଁ ଧାନକ୍ଷେତରେ
ସର୍ବଦା ମା ରୁ ୪ ସେ.ମି. ଠିଆ ପାଣି
ରଖିବା ଉଚିତ ।”

ଦିନିଆ ଧ୍ୟାନ ଯଥା ଲକ୍ଷାନ୍ ସାହୁ

ଅଶ୍ରୁବଣ ହୁଏ । ଜଳର ଏପରି
ନଷ୍ଟକୁ ପୂରଣ ପାଇଁଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା
ମା ରୁଧି ଥେବା ମି ତିଆପାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ।

ଡାକ୍‌ଖାତୁଳେ ପାଇଁ ମୁଗ, ବିରି ଓ
ଖୁଡ଼ଙ୍ଗ ସଫଳତାର ସହ ହୋଇପାରିବ।
ମୁଗ ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠା ବୈଶାଖୀ, ମୁଜାତା
ଓ ଧଉଳ ଉପଯୁକ୍ତ । ବିରି ପାଇଁ ୮-୯
ନମ୍ବର ଏବଂ ଖୁଡ଼ଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏଥିଥେ
ଗ ନମ୍ବର ଭଲ । ଏକରକୁ ୧୩ କିଲୋ
ପଦ୍ମପେଟ ସାର ସହ ଜୀବାଣୁ ସାର
ପ୍ରୟୋଗକରି ଧାଢ଼ିକୁ ଧାଢ଼ି ୩୦ ସେ.ମି.
ବ୍ୟବଧାନରେ ବୁଣିଲେ ପାସଳ ଅଧିକ
ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପାଇଁ ଝଙ୍କିଆ ହୋଇ
ବଢ଼େ । ବାଲିଆ ମାଟିରେ ଗ ରୂପ ଦିନରେ
ପଚୁମାତିରେ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଦିନରେ ଏବଂ
ତିକଟାମାତିରେ ୧୪ ରୁ ୧୩ ଦିନରେ
ଜଳସେବନ କଲେ ପାସଳରୁ ୩୦ ରୁ ୩୦
ଦିନରେ ଗ ରୁ ୪ କୁଇଘାଲ ଅମଳ ମିଳେ ।

ପ୍ରାଣଭ୍ରତରେ ଟେଲିବାଜ ପାସଳ
ଆବେ ଚିନାବାଦାମ ପାଇଁ ଏକ ୧୨-
୨୪, ରାଶି ପାଇଁ ବିନାୟକ, କନକ
ଓ କାଳିକା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ପାଇଁ-
୭୮୪୧୩ ଓ ସନରାଜଙ୍କ ଉତ୍କଳ୍ପନ ।
ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ
ବହୁରାଜ ୪୫ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ
ଧାଢ଼ିରେ ବୁଣିଲେ ପ୍ରତ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ
ପାଇଁ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼େ । ଜଳସେଚିତ
ଚିନାବାଦାମକୁ ବାଲିଆ ଓ ପଚୁ କିଷମ
ମାଟିରେ ବୁଣିଲେ ଭଲ ପରାଗ ସଜମ
ହୋଇ ସ୍ରୀକେଶର ଧାରିକା ସହଜରେ
ମାଟିରେ ପ୍ରବେଶକରି ଅଧିକ ଅମଳ
ଦିଏ । ଟେଲିବାଜ ପାସଳ ମରୁ ୪୪ଥି
ଜଳସେବନ ଆବଶ୍ୟକ ହିଲେ ।

ତେଳବାଇ ଫେରି ପ୍ରସଲର ପୁଣ୍ୟଚିରା ଏବଂ
ମଞ୍ଜି ପାକନ ହେବା ସମୟରେ ଜଳସେବନ
ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ । ଗ୍ରାମରତ୍ନରେ
ଜଳସେବନର ସୁଖିତା ଥିଲେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତାପ
ଓ ଅଧିକ ସୁଧିକିରଣ ହେତୁ ପନିପରିବା
ଯଥା ପୋରକ, ବାଇଗଣଶ, ଭେଣ୍ଡି, କଳଗା,
କଖାରୁ ଜିତ୍ତ, ଛତ୍ରିଦ୍ଵା ଏବଂ ଶାଗ ପଥା
ଖଡ଼ା, ଲେଉଟିଆ ଓ ପୋଇ ଆଦି ଭଲ ହୁଏ ।
ପୋଟଳ ପାଇଁ ପ୍ଲାମୀଯ ଲମ୍ବ କିସମ ଉଚ୍ଚକୃଷ୍ଣ ।
ପୁଲ ଓ ପାଳ ଆସିବା ସମୟରେ ପୋଟଳକୁ
ଜଳସେବନ କରିବା ଉଚ୍ଚିତ । ଏହାପାଇବା
ଖରାରେ ପୋଟଳ ପାଟେ ନାହିଁ । ବାଇଗଣଶ
ପାଇଁ ପୁଷ୍ପକୁଣ୍ଡ ଓ ପୁଷ୍ପାପର ପଲ ଲଞ୍ଜ
ଭଲ । ଉଚ୍ଚ କିସମ ବାଙ୍ଗରା ଗୋଛିଲିଆ
ହୋଇ ବଢ଼ି ମାଟିର ଜଳ ଉପସେବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
କମାଣ । କେବଳ ବିଷ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ (୩

ମଲୀ ଗଛରେ କଟା କଲମି



କାନ୍ତିମାଳି...



କିମ୍ବା ସିମେଣ୍ଟ ଛାତ ଥିଲେ ତାହା
ଉପରେ ନଡ଼ା ପକାଇବାର ବ୍ୟବରୁ
କରନ୍ତୁ ।

► ଏକ ହେଳ୍କୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଖର
ପାଇଁ ଦୈନିକ ୩.୪ କି.ଗ୍ରା. କାଣ୍ଡିଆ
କୁଣ୍ଡା ଓ ୩.୪ କି.ଗ୍ରା. ତିନାବାଦାମ
ପଢ଼ିଆର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି
ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।

► ଆଜୁ ଖୋଲିବା ପରେ ତାହାର
ପବନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଛାଇ
ଜାଗାରେ (ଖୋଲାଘର, ଛାତ ଥିବ
ଖଳା ପ୍ରତ୍ଯେତି) ପଡ଼ଳା ପୁରବେ
୧-୮ ଦିନ ରଖି ୩-୪ ଦିନ
ଅନ୍ତରରେ ପୋରା ଆଜନ୍କ ଅଳଗରୁ

