



ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

## ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂମିପୂଜନ

ବୁଧବାର, ୨୮ ଜୁନ ୨୦୨୩, ଦିବା ୧୦ ଘଟିକା, ଭୁବନେଶ୍ୱର



### ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

- ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥାପନ୍ୟ, ପ୍ରତିହିସିତ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟର ପୁନରୁଜ୍ଜ୍ଵାର ।
- ଯାନବାହାନ ଯାତାନ୍ୟତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ୧୨-୧୮ ମିଟର ଚତୁର୍ଭାବର ବିଶିଷ୍ଟ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରାଫିକ ଲେନ୍ ନିର୍ମାଣ ।
- ପଥଚାରୀଙ୍କ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ୪-୧୦ ମିଟର ଚତୁର୍ଭାବର ଚଲାପଥ ନିର୍ମାଣ ।
- ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ବାହ୍ୟପର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ।
- ଉତ୍ତର ମାନଙ୍କ ସୁବିଧାଜନକ ସମାଗମ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ସଂଯୋଗୀ ଖୋଲା ଶ୍ଵାନ ସୃଷ୍ଟି ।
- ତାର୍ଥ୍ୟାତ୍ମୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ୩୦୦ ବର୍ଗ ମିଟର ଜାଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
- ଜରୁରାକାଳୀନ ସେବା ଏବଂ ସୁବିଧା ନିମିତ୍ତେ ୧୦୦୦ ବର୍ଗ ମିଟରର ଏକ ସୂଚନା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ବିକାଶ ।
- ବିନ୍ଦୁସାଗର ଚାରିପଟେ ପଦଚାରୀଙ୍କ ପରିଭ୍ରମଣ ଉଥା ରାତିନାତି ନିମିତ୍ତେ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଚଲାପଥ ନିର୍ମାଣ ।

ଡ୍ରେବ ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ

ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ / ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲେରେ ଏହି ଐତିହ୍ୟିକ ଶିଳାନ୍ୟାସର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅଛୁ ।

ସ୍ଥାନ୍ୟର



ହିଟ୍ରେ  
[https://twitter.com/ SLTA\\_Lingaraj](https://twitter.com/SLTA_Lingaraj)

ଫେସ୍ବୁକ

Bhubaneswar



























# ପଥଳ ମୁଣ୍ଡରାଷ



ଆଉତ୍ତରାଶ ଜିଳ୍ହାରେ ନିଗିଡ଼ା ଜମିରେ  
ସାଥୀ କିସମ ପୁରୀ (ଧଉଳି, ଦୁର୍ଗା, କାମଦେବ,  
ଆଇପିଏମ୍ ୦୨-୩, ଆଇପିଏମ୍ ୦୨-୧୪),  
ଦିରି (ସାରଳା, ପ୍ରସାଦ, ଉଜାଲା, ମାହୁରି,  
କାଶୀ), ହରତ୍ (ଉପାସ, ଆଶା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ),  
ବରଗୁଡ଼ି (ଉଚ୍ଚଳ ମାଣିକ, କାଶୀ କାଞ୍ଚନ) ଅଦି  
ଶାୟ ଧାଢ଼ିରେ ଝୁଣ୍ଡି ଦିଆନ୍ତୁ । ବିହନ୍ତୁ ଟିପ୍ପଣିଶକ  
ଓ ଜାବାଶୁ କଳିତର ଉପାରକରି ବୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ । ୧୦  
କି.ଗ୍ରା. ମଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରତି ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ରାଇଜେବିଯମ୍  
ଓ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରସଂଗସ୍ଥ ଜାବାଶୁର  
(ପିଏସବି) ସିଂହି ଗୋକାଇ ବୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ  
ଯାସମରା ବିଷ ପେଣ୍ଠିମୋଥାଲିନ୍ ହେକ୍ଟର  
ପ୍ରତି ୦.୭୫ କି.ଗ୍ରା. କିମ୍ବା ଅନ୍ତିଫ୍ଲାରୋଫେନ୍  
୦.୦୩ କି.ଗ୍ରା. ମଞ୍ଜି ଝୁଣ୍ଡିବା ପରଦିନ ଜମିରେ  
ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଯାସମରା ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ  
କରି ନ ଥିଲେ ଝୁଣ୍ଡିବାର ମା ସପ୍ତାହ ପରେ  
କୋଡ଼ା ଖୋରା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଆନ୍ତୁ ।

# କୁଣ୍ଡଳୀ ଘର ଯତ୍ନ



## ଆହୁ କଥାରତ୍ନ ଜଳ ନଷ୍ଟାସନ

ଆଖୁ କାରିରେ ଅଧିକ ପାଶି ହେଲେ ନିଷାସନ  
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଫେବ୍ରାରୀ ୪-୫ ମାସର ହୋଇଥିଲେ  
ଡେଲା ବନ୍ଦ କାମ କରନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା  
ପରେ ଶୁଷ୍ଠିଜା ପାଶ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲେ ଅଗରିକା  
ପୋକର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟବ ବଢ଼ିଥାଏ । ସଥଳ କାଣ୍ଡିକା  
ଓ ଅଗରିକା ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ହେବୁର ପ୍ରତି  
୧୯୪୦ ମି.ଲି. ଫିପ୍ରେନିଲ୍/ଲୋରୋଆନ୍ତିଲିପ୍ରୋଲ  
ନେଟ୍ୟ ମି.ଲି., ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ  
ଫେବ୍ରାରୀ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ସଥଳ କାଣ୍ଡିକା  
କାଟନ୍ତୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ହେବୁର ପ୍ରତି ୧୦ଟି  
ହିସାବରେ ଗ୍ରାଇକୋକାର୍ଟ ଫେବ୍ରାରିରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ । ପ୍ରତି  
କଦାରେ ଫିପ୍ରେନିଲ୍ ଦାନାଦାର ବିଷର ୩-୪ଟି ଦାନା  
ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଶେଷ ଦିନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରା ନ  
ହୋଇଥିଲେ ହେବୁର ପ୍ରତି ୭୭ କି.ଗ୍ରା. ଯବନ୍ଦ୍ରାରଜାନ  
ସାର ୧୯୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଆଖୁ  
ଫେବ୍ରାରିରେ ଯବନ୍ଦ୍ରାରଜାନ ଜାମୀୟ ସାରନ୍ତୁ ୧୯୦  
ଦିନ ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଠିତ ମୁହଁଁ ।



# ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକାଶକୀୟର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଖୁମୋଡ଼ି ପ୍ରଶାଳୀରେ  
ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।  
୧ ହେଲୁର ଜମୀ ପାଇଁ ୧୫  
ଡେସମିନି ଜମିରେ ତଳି ପକାନ୍ତୁ । ତଳି  
କିଆରିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷକରି  
ସେଥିରେ ୪୦ ଖୁଣ୍ଡି ଖତ ଦେଇ ୧ ମିଟର  
ଓସାର ଏବଂ ୧୫ ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚ ପଶାଳି  
କରନ୍ତୁ । ପଶାଳିଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ବା ସୁବିଧା  
ଅନୁଯାୟୀ କରନ୍ତୁ । ୨ ପଶାଳି ମଞ୍ଜିରେ  
୩୦ ସେ.ମି. ଓସାର ନାଲ ଛାଡ଼ିବେ  
କାରଣ ସେହି ନାଲଦେଇ ବେଶୀ ବର୍ଷା  
ହେଲେ ପାଣି ନିରାଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଯିବା  
ଆସିବା ମଧ୍ୟ କରିଛେବ । ତଳିଘରାରେ  
୪ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରସରରେ ଓ ୪ କି.ଗ୍ରା.  
ପଶାଳ ଖାଦ୍ୟଯାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ  
ପଶାଳିଗୁଡ଼ିକରେ ମିଶାଇ ସେଥିରେ ୪  
ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ଧାତ୍ର ଧାତ୍ର କରି  
ବିହନ ବୁଣୀ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ବର୍ଷା  
ନ ହେଲେ ପଶାଳିରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବେ ।  
ବିହନକୁ ପିଣ୍ଡନାଶକରେ ବିଶ୍ଵାଧନକରି  
ପଶାଳିରେ ବୁଣାନ୍ତୁ । ସହଜ କିସମର  
ଧାନତଳି ୨୦-୨୨ ଦିନର ଓ ବିଳମ୍ବ  
କିସମ ଧାନତଳି ୧୫-୧୦ ଦିନର ହେଲେ  
ରୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ବୁଣାଧାନ ୩୦-୪୫  
ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ବେଉଷଣ କାମ  
ଶୀଘ୍ର ପାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଅନୁମୋଦିତ ସାର  
ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଜମିରେ ୪ ସେ.ମି.




## ଜୁଲାଇ ୧୯୮୮ କୃଷି ସୂଚନା

ମନ୍ଦିର ଅନୁମୋଦନ ପରିପରୀକ୍ଷା ଓ ପଚାର  
ଜୀବିତର ସହ ଅର୍ଦ୍ଧକ ଯବକ୍ଷାରଜାନ  
ପ୍ରୟୋଗ କରିଛୁ। ଧଣିତା ବୁଣ୍ଡାଯାଇଥିଲେ  
ହେଲ୍ପର ପ୍ରତି ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ୨, ୪-ଟି  
ଯୋଡ଼ିଯମ ସଲ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗକରି ଧଣିତା  
ମରିଗଲା ପରେ ଜମିରେ ଚାଷକରି  
ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆନ୍ତୁ ଜିମା ଧଣିତାକୁ  
(ଫୁଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ) ସିଧା ସଲଖ ହଳ

# ପଂକ୍ତିର ସମୟରେ...

ଆମ, ନଷ୍ଟିଆ, ପିଲୁଳି, ସାପେଶା, ଲି  
ପଣସା, ଅମୁତଭଣ୍ଡା, କମଳା, ଲେଖୁ ଆଦି  
ଉନ୍ନତ ବା ସଙ୍କର କିମ୍ବା ଗଛ କିମ୍ବା କଳା  
ଗଛ ଥାଣି ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରଶାଳାତେ  
ଗୋପନୀ କରନ୍ତୁ । କଳମୀ ଚାରାର ମା  
ଗଛ ଅଂଶରୁ ବାହାରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗ  
ଢାଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବିଥିଲୁ । ଫଳ ବରିଚି  
ଘାସ ଓ ଅନାବନା ଗଛ ନଷ୍ଟକି ସଫାପୁରୁଷ  
ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ ଦଫା ଯାକୁ ଏହି ସମୟର  
ଗଛମୂଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଦରକ  
ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଗଛରେ କାଟାବାଣୀ କର  
ଓ ବୋର୍ଡାପେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଲେପ ଦିଅନ୍ତୁ । ଚାହେ  
ମୂଳରୁ ଜଳ ନିଷାଧନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ



# ପ୍ରାଣୀ ଜୀବାତ୍ ଓ ପୃତ୍ତିକାର

କ୍ଲୋଇଣ୍ଟୋ ମାଇସନ, କୋଟ୍ରିମାର୍କିନ,  
ଫର୍ଟିପାଏଡ ପ୍ରୋକେନ, ପେନସିଲିନ୍  
(ୱେପିପି) ୨୦-୪୦ଲକ୍ଷ ଏକକ,  
ଅଞ୍ଚିତର, ପାମ (ପ୍ରୋକେନ  
ପେନସିଲିନ୍ ସରାଭାଇ) ଭେଟକୁଳ୍ପ  
ଫର୍ଟ ଆଦି ରଙ୍ଗେଶନ ସହ ଆଭିଲ,  
ସ୍ଥିରଏଡ ଓପିଶର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଗଲେ  
ରୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ଭଲ ହୁଏ । ଅତ୍ୟଧିକ  
ଫୁଲା ପଡ଼ିଥିବା ମାଂସ ଭିତରେ ଘାଁ  
ମୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ଏହି ପ୍ଲାନରୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାୟା  
ଓ ପାଣିଆଖା ବାହାରକରି ପ୍ରତିଦିନ  
ଡ୍ରେସିଂ କରିବା ଦରକାର । ପ୍ରତିଶେଷକ  
ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଵରୂପ ଅଛି ବୟକ୍ତ ଗମାସରୁ  
ଉର୍ଧ୍ଵ ଏବଂ ନ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଥିବା ସମସ୍ତ  
ବାହୁରା ଓ ଗୋରୁଙ୍କୁ ବଜବଜିଆ  
ବା କିକିତ୍ର ଟିକା ଦେବା ଦରକାର ।  
ଫାରୁକ୍ସ୍ ରୋଗ : ଏହା ଏକ  
ଭୁତାନୁଜିନିତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଏବଂ  
ସମସ୍ତ ଖୁରାଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଯଥା-ଗୋରୁ  
ମଙ୍ଗାଣୀ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଡା ଓ ମୁଷ୍ଟରିଠାରେ

ହର ପୋଟକା, ପାଣିର ଲାଳ, ଦୁଇ  
ପରିସ୍ଥାରେ ଏହି ରୋଗର ଭୂତାଶୁ  
ପାରଣଟିକେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଉଚ୍ଚ ରୋଗ  
ପାରଣଟି ପ୍ରାଣମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ର  
ବା ଓ ମୁହଁରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ରୋଗ  
ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଇଙ୍କ ଦୁଇ  
ବା ଓ ବଳଦମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା  
ପାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାହୁଆରୋଗ  
କୁ ରହୁରେ ନ ହୋଇ ବର୍ଷତମାନ  
କିନ୍ତୁ ଛୁନରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି  
ଗାରେ ଗୋରୁଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଉତ୍ତାପ  
୪-୧୦୩ ଡିଗ୍ରୀ ପାରେନସାଇର୍କ୍‌ଲ୍ୟୁ  
ପାଏ । ହଠାତ୍ ଗାଇଙ୍କର କ୍ଷୀର ଦେବା  
ହୋଇଯାଏ । ଖୁବା ସନ୍ଧି, ପାଟି  
ରେ ବିଜିନ୍ ଆକୁତିର ପୋଟକାମାନ  
କାଇ ୨-୩ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପାଣିଯାଏ ଓ  
ରେ ପରିଣତ ହୁୟ । ବେଳେବେଳେ  
ର ଉପର ଅଂଶ ଘା' ହୋଇ ଛିନ୍ତି  
ଥିରି ଆସେ । ଗୋରୁ କିଛି ଖାଇାନ୍ତି ନାହିଁ  
ତିରୁ ଅତିମାତ୍ରରେ ଲାଳ ବାହାରେ ।

ଲାଗେ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୁଏ । ପ୍ରାଣୀ  
ଛୋଟାଏ । ବାହୁରାଜୁ ରୋଗ ହେଲେ  
ହୃଦୟିଶ୍ଵରର ଶତ ବା ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି ହେବା  
ଯୋଗୁ ମୂଳ୍ୟବରଣ କରନ୍ତି । ଆକ୍ରାନ୍ତ  
ଗୋରୁର ଘା' ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଖୁରା ଓ  
ପାଚିକୁ ୫-୧୦% ଖାଇବା ଯୋଡ଼ା କିମ୍ବା  
୦.୧% ପୋଗୀସିମା ପରମାଙ୍ଗାନେବୁ  
ମିଶ୍ରିତ ଉଷ୍ଣମ ପାଶିରେ ଧୋଇଦେବା  
ଦରକାର । ଖୁରା ଓ ପାଦକୁ ଧୋଇବାରିବା  
ପରେ ହିମାକୁ, ଏକ୍ଷେଷେପ ମଳମ କିମ୍ବା  
ନିଓଷ୍ଟୋରିନ୍ ପାଉଡ଼ର  
ଲଗାଇ ପାଟି ବନ୍ଧିଦେବା ଦରକାର ।  
ଗର୍ଭକର୍ପୁର ନିଢ଼ିଆତେଳ ଲଗାଇଲେ ମାଛି  
ବସି ଘା'ରେ ପୋକ ହେବାର ଭଲ୍ଲ ନ  
ଥାଏ । ପାଚିର ଘା' ହୋଇଥିଲେ ୧-୨%  
ବୋରେକୁଷେରିନ୍ ଡରଳ ପାଚିର ତାଳୁ ଓ  
ଜିଜ ଆଦି ଛୁନିରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର ।  
ଗୋଡ଼ ଖୁରା ଉପରେ ଫୁଲିଥିଲେ କିମ୍ବା  
ପାଟି ବା ଜିଜର ଘା' ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ  
ଆଶିବାଓଟିକ୍ ଲଞ୍ଚେକଶନ ଅଟିକମ୍ପରେ

A large, light-colored cow, possibly a Brahman or similar breed, stands in a fenced enclosure. The cow has a thick coat and is looking towards the left. The background shows a wooden fence and some greenery.

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବର୍ଷରେ ୨୫ଶ  
ପ୍ରତିଶେଷଧକ ଏଥୁମଣ୍ଡି କିଳା ଦିଆଯିବା  
ଦରକାର । ଗୋରୁଙ୍କୁ ପାହୁଆ ହେଲେ  
ସୁଖ ଗୋରୁଠାର ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ  
ଗୋରୁଙ୍କୁ ଭାଇରଖାନା ଅଣି କିମ୍ବା ଜରିବ  
ପରିଚରେ ଘରୋଇ ଭାବେ ତିକିଥା କରନ୍ତୁ  
ଗାଇଙ୍କ ବସନ୍ତ : ଏହା ଏକ ଭୂତାଣୁଜନିତ  
ରୋଗ ଓ ଦୁଃଖଆଳୀ ଗାଇଙ୍କଠାରେ

ତେ ଚିରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଲ ବ୍ରଶ  
ପରି ଫୋଟକା ଦେଖାଯାଏ । ଗୋରର  
ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାରେ ଏହି ବ୍ରଶରୂପକ ଅଂଶକୁ  
ଛୁଳ୍କିଲେ ଗାଣ ଓ ଗରମ ଲାଗେ । ପରେ  
ଏହୁଡ଼ିକ ଫୋଟକାରେ ପରିଣାତ ହୋଇ  
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଦେଖାଯାନ୍ତି ।  
ତା'ପରେ ଏହୁଡ଼ିକ ଗାଡ଼ ବିଜ୍ଞଳିବର୍ଷତ୍ତୁ  
ଧାରଣ କରନ୍ତି ଓ ଶୁଣ୍ଠ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ନ୍ତା  
ବାହୁରୀମାନେ ଏ ଗୋଟ ହେଲେ  
ସେମାନଙ୍କ ପୁହଁ ଓ ନାକପୁହ୍ତାରେ  
ଫୋଟକା ଦେଖାଯାଏ । ଗାଇର କ୍ଷୀର  
ଦେବା ହ୍ରାସ ପାଏ । ୧% ପଚାରିଯମ  
ପରମାଣ୍ଜାନେର ମିଶ୍ରିତ ଉଷ୍ମମ ପାଣିରେ  
ପହାକୁ ଭଲଭାବେ ଧୋଇଦେବା  
ଦରକାର । ତା'ପରେ ଜିକ୍କ ଅକ୍ଷସାଳଡ଼  
କିମ୍ବା ହିମାକୁ ମଳମ ଦେଖିକ ୨ଥର  
ପହାର ଉପରଭାଗରେ ଲଗାଇଲେ  
ଏହି ଗୋଟ ଶାନ୍ତ ଭଲ ଝୁଏ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ  
ଜୀବାଶୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା  
ପାଇଁ ଆର୍ବିକାର୍ତ୍ତିକୁ ଓ ପହାର ଯନ୍ତ୍ରଣା  
କମାଇବାପାଇଁ ଦରକ ଇଞ୍ଜେକ୍ଶନର  
ସାହାଯ୍ୟ ନିଆୟାଇପାରେ ।

-ଡା. ବୀରକିଶୋର ପରିଷା, ଅନ୍ତିର୍ଦ୍ଦୂ  
ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ(ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ), ପ୍ରାଣୀ  
ପାଳନ ଓ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ,















