

ସୋରିଷ ଚାଷ: ଜିଞ୍ଜପୋକି ଦମନ

ସୋରିଷ ଚାଷରେ ଜିଞ୍ଜପୋକି ଦମନ ପାଇଁ ହେଲୁର ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ମି.ଲି. ତାମିଥୋଏସ୍-୩୦ ଲ.ବି. କିମ୍‌ ଲିମିଡ଼ାକ୍ୟୁଡ୍ ୧୦.୮ ଏସ୍.୬୯. ୧୯୪ ମି.ଲି. ବା ଆୟୋଜିଥୋକ୍ତାମ୍ ୨୫ ଏସ୍.ଭି. - ୧୨୫ ଗ୍ରାମକୁ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଉପରବେଳୀ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପରସଲରେ ପତ୍ରିତା ଦାଶ ଦେଖାଦେଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ହେଲୁର ପ୍ରତି ୧.୫ କି.ଗ୍ରା. କପର ଅଛିକ୍ରୋରାଇତ୍ ବା ୧.୫ କି.ଗ୍ରା । ମାଙ୍କୋଜେବରୁ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କରିଥିଆ ମାଛି/ପତ୍ରିତା ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ହେଲୁର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମି.ଲି. ଇଥୋଫେନ୍ପ୍ରଟ୍ ୧୦ ଲ.ବି. କିମ୍‌ ୪୦୦ ମି.ଲି. ଇଣ୍ଟାକାର୍କାର୍ ୧୪.୪% ଲ.ବି. ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ସୋରିଷ ଚାଷ ପାଇଁ ଜନ୍ମତ କିସମର ବିହନ ଚମନ କରନ୍ତୁ । ତା' ସହ ଚାଷ ସମୟରେ ଏଥରେ ଦେଖାଦେଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗପାଇଁ ବିଶ୍ୟରେ ସତେନ ରୁହନ୍ତୁ । ସୋରିଷ ଚାଷରେ ପାଇଁ ଶିଥିଥାରୀ ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରୋପିକୋନାକୋଲ୍ ୧ ମି.ଲି. କିମ୍‌ କିମ୍‌ କାରାଥେନ୍ ୧ ମି.ଲି. / ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।



ପନିପରିବା ସମ୍ପର୍କରେ...

ବିଲାତି ବାରଗଣ ୫ ବାରଗଣର ଖାଲୀ ରୋଗ ପାଇଁ ୨୫ ଗ୍ରାମ କପର ଅଛିକ୍ରୋରାଇତ୍ ସହ ୧.୫ ଗ୍ରାମ ସେପ୍ଟେମ୍ବରକ୍ଷିତ୍ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ରାନ୍ ମୂଳକୁ ଭିକ୍କାରୁ । ଲକ୍ଷ ପାଇସଲରେ ଉଚ୍ଚିତ୍ତା ପୋକ ଲାଗିଥିଲେ ୪ ଗ୍ରାମ ଏସିଟମିପିଡ଼ ୨୦ ଏସ୍.ପି.କ୍ରୁ କିମ୍‌ ୧୫ ମି.ଲି. ଆବାମେନ୍କିନ୍ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ସହକ କିସମ ଫୁଲକୋରିରେ ଶାକୁଆ ଲାଗିଲେ ୪ ମି.ଲି. ନିମାତେଳେ ୦.୧୫କୁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସପ୍ରାହେ ଅନ୍ତରରେ ୨ଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପାଲଙ୍ଗ, ଧିନିଆ, କୋଶଳା ଆଦି ଶାଗ ଶାଶ କଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିପାରିବା । ଆକୁ ପାଇଁ ହେଲୁର ପ୍ରତି ୨୦ ରୁ ୨୫ କୁଣ୍ଡଳ ବିହନ ଦରକାର ହୁଏ । ୨-ଗତି ଆଖୁ ଥିବା ୨୫ ଗ୍ରାମର୍ ୩୦ ଗ୍ରାମ ଓ ୨୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍‌ କିମ୍‌ କାରାଥେନ୍ ୨୦ କେ.କ୍ର. ଯବକ୍ଷାରାଜାନ, ୨୦ କେ.କ୍ର. ପସପେତ୍ ୩ ଓ ୧୦ କେ.କ୍ର. ପଚାସ ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଅନ୍ତର...



ଜମି ବଢ଼ିବାର ଦେଖୁ ସଥଳ କିସମ ରାଶି ବୁଝନ୍ତୁ । ରାଶି ଉନ୍ନତ ବିହନ କିସମର୍ତ୍ତିକ ହେଲା - ବିନାୟକ, କନକ, କାନ୍ଦିକା, ପ୍ରାଣ, ନିରକା, ଦମନ, ଉଷା, ଅନ୍ତିର୍ଦ୍ଦ୍ଵାରା ଶୁଣୁଥା । ହେଲୁର ପ୍ରତି ୦.୪-୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନରେ କାର୍ବୋକ୍ଲିନ୍ + ଥାରମ ୨ ଗ୍ରାମ ଗୋକାଇ କିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ । ବିହନ ସହ ସମାନ ପରିମାଣରେ ବାଲି ମିଶାଇ ଧାତ୍ତିକୁ ଧାତ୍ତି ୩୦ ସେ.ମି. ଓ ମଞ୍ଜିମଣ୍ଟ ୧୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ୧ ସେ.ମି. ଜଗାରେ ବିହନ ବୁଝନ୍ତୁ ।



ପାଣି ଜମିଥିଲେ ନିଷାଧନ କରନ୍ତୁ । ବିହନ ପାଇଁ କିଆରିରୁ ନାଗୋର ଆଖୁ ବାହି ଚିକ୍କ ବିଅନ୍ତୁ । ନାଲି ଶତା ଆକ୍ରାତ ବୁଝା ଉପାଦି ନାଲ୍ କରନ୍ତୁ । କିମ୍‌ ବିହନ ପ୍ରତି କିଶୋଧନ କିଶୋଧନ + ଥାରମ ୨-୮୪୧୪, ଲ.ବି.-୮୪୧୪ ହେଲୁର ପ୍ରତି ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ତିନାବାଦାମ ବିହନ ଅର୍ଥାର ୧୯୪ କି.ଗ୍ରା. ତିନାବାଦାମ ମଞ୍ଜି ସହ ରାଜଗେହିମଣ୍ଟ ଜାବାଶୁ କଲାର ବ୍ୟବହାରକିରି ଧାତ୍ତି ୨୫ ସେ.ମି. ଓ ଗର୍ଭ ଗର୍ଭ ୧୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ କିମାନ ବୁଝନ୍ତୁ ।

ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଆଖୁ କିଆରିରେ



ହୋଇଥାଏ ।

➤ ଚାଷ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତ୍ତ ଜଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ନାହାଏ ।

➤ ସାମିତ ଜଳ ଓ ଜିନ୍ଦିରୁ ଅଧିକ ମସି ଉପାଦନ ହୋଇଥାଏ ।

➤ ମାହିମାନେ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଆଶାକା କମ ଥାଏ ।

➤ ମାହିର ଖାଦ୍ୟ ଅପରିଯୁକ୍ତ ଏହାର ବିଆଇପାରେ ।

ବାଯୋପ୍ଲାକ୍ ପରିତିରେ ମାତ୍ର ଉପାଦନ ହୋଇଥାଏ ।

ବାଯୋପ୍ଲାକ୍ ପରିତିରେ ମାତ୍ର ଉପ

