



ମିଶନ
ଶକ୍ତି
ସମ୍ମାନ ମହିଳା | ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶା



ଗତିଶୀଳତା ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ

ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍କୁଟର ଯୋଜନା

- ₹ 528 Cr.
ସ୍କୁଟର ଯୋଜନା ସୁଧ ଛାଡ଼ି
- ₹ 250 Cr.
ଜିପିଏଲ୍‌ସ୍ ଅପିସ ଗୃହ
- ₹ 150 Cr.
2.5 ଲକ୍ଷ ଏସ.୬୮.ଜିଙ୍କୁ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ
- BLF ଓ DLF ନିମନ୍ତେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା

ସମ୍ମାନ ମହିଳା | ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶା



ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ଗାନ୍ଧିକୁ ପଟ୍ଟିପଟ୍ଟି ମାରିଦେଲେ, ଜଣେ ଗିରଫ୍ତ | ପ୍ରତିବାଦରେ ଟାଯାର ଜାଳି ରାସ୍ତାଗୋଟେ

ଭୃତ୍ୟ, ୧୦୧୦ (ସନାତନ ରାତର)

ଉଦ୍‌ବ୍ୟାକାରୀ ବାରିକଙ୍କରେ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନେଥିବା ଗୋଟିଏ ଗାନ୍ଧିକୁ ଗୋଟିଏ ଗାନ୍ଧିକୁ ଗୋଟାଳାଙ୍କରା ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଉଥ୍ୟକୁ ଲୋକେ ମଙ୍ଗଳବାର ଗାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତାଗୋଟେ କରିଥିଲେ । ସୁଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦୩୦ ବେଳେ ଉଥ୍ୟକୁ ଆହୁ କେତେକ ଗାନ୍ଧି ବେପାରାମାନେ ଉଡ଼କ ଅଭିଷ୍ଠଣେ ଚଲାଇ ଚଲାଇ ନେଥିଲେ । ବାରିକଙ୍କରେ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଗାନ୍ଧି ବାଲି ନ ପାରି ଶୋଇ ରହିବାରୁ ସେମାନେ ତାକୁ ନିୟମ ମାତ୍ର ମାରିଥିଲେ । ଏହି ମାତ୍ରରେ



ବିକଳକରେ ରାସ୍ତାଗୋଟେ ସ୍ଥଳରେ ଏଥିରେଇ ଘୋର ଓଡ଼ା ଏବଂ ଉତ୍ସବିଦାର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶର ଖୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ରୁଷ୍ଣାଶ କରୁଛନ୍ତି ।

ଗାନ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ ଘର୍ଥିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକଷଦର୍ଶୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଭେଜନା ପକାଶ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଘର୍ଣ୍ଣା ପରେ ସ୍ନାନୀୟ ପାଇବା ସହ ମୃତ ଗାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ।

ରାସ୍ତାଗୋଟେ କରିଥିଲେ । ଖରର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ପ୍ରାତି ପ୍ରଗାର ପ୍ରମୁଖ ମାନସ ମହାନ୍ତି, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସହ ସଂଯୋଜନ ତପନ ମହାନ୍ତି, ଧୀରନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଘରାଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚିଗେ ହୃତ୍ୟାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଟୋର ଦଶ ସହ ଗୋଟାଳାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ ପାଇଁ ଦବି କରିଥିଲେ । ଦୋଳସାହି ଓ ଉତ୍ସବାର ଗୋରୁହାତ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଣିଜ୍ୟାଦେଶୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରେବେଶ୍ୱର ବନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମାନସ ମହାନ୍ତି ପ୍ରାଣସନିକ ଓ ଯୋଳିଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାକୁ ନିକଟରେ ଦବି ରଖିଥିଲେ । ଏମେଇ ସାବରଜ ପୋଲିସ ନିଜ ଆହୁ ଏକ ମାମାଲା (ନଂ. ୨୧୮ /୨୧) ହାତୁ କରିଛି । ଏହି ଘର୍ଣ୍ଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାରୀ ଗ୍ରାମାଙ୍କର ଆମା ଅଧୀନ ରୁଷ୍ଣଦରତା ଗ୍ରାମର ସେଇ ଆୟମ ଗିରଫ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆନାଧକାରୀ ରାମା ବଜ୍ରା କହିଛନ୍ତି ।

ସଦର ଏଥିରେ ସୌରଭ ଓଡ଼ା,

ସ୍ନାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବନହରି ସାହୁ, ବିଶ୍ୱ

ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ସମିତି

କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ

ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସେପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ

ଗୋରୁ ହାତ ବନ ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ

ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତାଗୋଟେ ହେତୁଥିଲା ।

ପରେ ମୃତ ଗାନ୍ଧିର ଅନ୍ତିମ ସଂକାର

କରାଯାଇଥିଲା । ଏମେଇ ସାବରଜ

ପୋଲିସ ନିଜ ଆହୁ ଏକ ମାମାଲା

(ନଂ. ୨୧୮ /୨୧) ହାତୁ କରିଛି ।

ଏହି ଘର୍ଣ୍ଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାରୀ ଗ୍ରାମାଙ୍କର

ଆମା ଅଧୀନ ରୁଷ୍ଣଦରତା ଗ୍ରାମର ସେଇ ସାବରଜ

ପରେ ରାସ୍ତାଗୋଟେ ହେତୁଥିଲା ।

ଏହି ଘର୍ଣ୍ଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାରୀ ଗ୍ରାମାଙ୍କର

ଆମା ଅଧୀନ ରୁଷ୍ଣଦରତା ଗ୍ରାମର

ପରେ ରାସ୍ତାଗୋଟେ ହେତୁଥିଲା ।

ଏହି ଘର୍ଣ୍ଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାରୀ ଗ୍ରାମାଙ୍କର

ଆମା ଅଧୀନ ରୁଷ୍ଣଦରତା ଗ୍ରାମର

ପରେ ରାସ୍ତାଗୋଟେ ହେତୁଥିଲା ।

ଏହି ଘର୍ଣ୍ଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାରୀ ଗ୍ରାମାଙ୍କର

ଆମା ଅଧୀନ ରୁଷ୍ଣଦରତା ଗ୍ରାମର

ପରେ ରାସ୍ତାଗୋଟେ ହେତୁଥିଲା ।

ଏହି ଘର୍ଣ୍ଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାରୀ ଗ୍ରାମାଙ୍କର

ଆମା ଅଧୀନ ରୁଷ୍ଣଦରତା ଗ୍ରାମର

ପରେ ରାସ୍ତାଗୋଟେ ହେତୁଥିଲା ।

ଏହି ଘର୍ଣ୍ଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାରୀ ଗ୍ରାମାଙ୍କର

ଆମା ଅଧୀନ ରୁଷ୍ଣଦରତା ଗ୍ରାମର

ପରେ ରାସ୍ତାଗୋଟେ ହେତୁଥିଲା ।

ଏହି ଘର୍ଣ୍ଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାରୀ ଗ୍ରାମାଙ୍କର

ଆମା ଅଧୀନ ରୁଷ୍ଣଦରତା ଗ୍ରାମର

ପରେ ରାସ୍ତାଗୋଟେ ହେତୁଥିଲା ।

ଏହି ଘର୍ଣ୍ଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାରୀ ଗ୍ରାମାଙ୍କର

ଆମା ଅଧୀନ ରୁଷ୍ଣଦରତା ଗ୍ରାମର

ପରେ ରାସ୍ତାଗୋଟେ ହେତୁଥିଲା ।

ଏହି ଘର୍ଣ୍ଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାରୀ ଗ୍ରାମାଙ୍କର

ଆମା ଅଧୀନ ରୁଷ୍ଣଦରତା ଗ୍ରାମର

ପରେ ରାସ୍ତାଗୋଟେ ହେତୁଥିଲା ।

ଏହି ଘର୍ଣ୍ଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାରୀ ଗ୍ରାମାଙ୍କର

ଆମା ଅଧୀନ ରୁଷ୍ଣଦରତା ଗ୍ରାମର

ପରେ ରାସ୍ତାଗୋଟେ ହେତୁଥିଲା ।

ଏହି ଘର୍ଣ୍ଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାରୀ ଗ୍ରାମାଙ୍କର

ଆମା ଅଧୀନ ରୁଷ୍ଣଦରତା ଗ୍ରାମର

ପରେ ରାସ୍ତାଗୋଟେ ହେତୁଥିଲା ।

ଏହି ଘର୍ଣ୍ଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାରୀ ଗ୍ରାମାଙ୍କର

ଆମା ଅଧୀନ ରୁଷ୍ଣଦରତା ଗ୍ରାମର

ପରେ ରାସ୍ତାଗୋଟେ ହେତୁଥିଲା ।

<p

କୁଳାଙ୍ଗାରୀ ବୃକ୍ଷର ଟିକା

A photograph showing a large group of white chickens with prominent red combs and wattles. They are crowded together, filling the frame. The chickens appear to be young, possibly broiler chickens, used for meat production.



ବାଇଶଶରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପୋକ ପରିଚାଳନା

କାଇଗଣରେ ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡିକିଶା ପାକର ଦମନ ପାଇଁ ସମନ୍ତିତ ପୋକ ପରିଚାଳନା ପଢ଼ି ଅନୁସାରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦,୦୦୦ ଟ୍ରାଙ୍କୋଟ୍ରାମା ପରାଶ୍ରୀୟା କାଟ ଛାଡ଼ିବୁ ନହେଲେ ୩୦୦୦ପିଯିଏମ୍ ନିମ୍ନଜାତ କାଇଗଣାକିମ୍ବୁ ଏକର ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ଥଥବା ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ଗ୍ରାମ କାର୍ବରିଲ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଖାରୁ ଜାତୀୟ ଫ୍ରେଶରେ ଲାଲ ଓ କଳା କଖାରୁ ଭୁଲ୍କ ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦୦ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କାର୍ବରିଲ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ ଲଜାମରିତ ଫ୍ରେଶରେ ପତ୍ରମୋଗା ଦେଖାଗଲେ ଏହାର ଦମନ ସକାଶେ ପ୍ରତି



ଡାକ୍ତିରି ପାଇଁ ପାଇଁ

ଏକ କି.ଗ୍ରା. ଡାଳିଙ୍ଗତୀଯ ବିହନ ପିଛା କାର୍ବେନ୍ଟିନ
 $73.8\% \times$ ଥରାମ୍ ୩୩.୪% ମିଶ୍ରିତ ତିଏଥ
 ପିସିନାଶକ ବିଷ ୨ ଗ୍ରାମ୍ ଗୋଲାଇ ବିହନ ବୁଣ୍ଡୁ।
 ହେଲ୍କ୍ର ପ୍ରତି ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ବିହନରେ ୪୦୦ ଗ୍ରାମ୍
 ରାଇଜେବିଯମ୍ ବାଜାରୁ କଳନ୍ତର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
 ବିହନକୁ ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣ୍ଡୁ । ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୩୦
 ସେ.ମି. ସ୍ୟାର୍ଥାନ ରଖନ୍ତୁ । ଜିମିକୁ ଡଳ ଭାବରେ
 ଚାଷ କରି ହେଲ୍କ୍ର ପିଛା ୧୦/୧୨ ଶଗଡ଼ ଶଡ଼ା
 ଗୋବରଖତ ବା କଞ୍ଚେଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ମୁଗ,
 ବିରିପାଇଁ ହେଲ୍କ୍ର ପ୍ରତି ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ,
 ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଫଂଟପେଟ୍ ଓ ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ପଶାଘ ଏବଂ
 ମଟର ପାଇଁ ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୪୦
 କି.ଗ୍ରା. ଫଂଟପେଟ୍ ଓ ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ପଶାଘ ସାର



ପ୍ରାଣୀଷାମଙ୍କ ବିଷାକ୍ତିକରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉକ୍ତିସା



ଡା. ହିମାଂଶୁ ବେହେରା

ଇତ୍ୟାଦି । ଏଥୁଯୋଗୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଉତ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ
ପୁଣି ଭାବ କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି, କୃଷି ସାର
: ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାର ଏବଂ
ରହ୍ୟମନ ପଦାର୍ଥ, ଜାଗନାଶକ ଦ୍ରୁବ୍ୟ, ମୂଳା
ମାରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁବ୍ୟ, କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ
ହେଉଥିବା ଦୂଷିତ ଦ୍ରୁବ୍ୟ ଏବଂ ବିକିରଣ ବିପଦ ।
ଇହା ପୂର୍ବକ ବିଶାଙ୍କରଣ : ଏହାର ଅର୍ଥ
ହେଉଛି ପ୍ରାଣାମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ରକରକ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ
ବିଶାଙ୍କରଣ କରାଇବା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ
ସେମାନଙ୍କ ଶରାରରେ ସ୍ଵାସକ୍ରିୟା ସମକ୍ଷାୟ
ଅଞ୍ଚ, ଯକୃତ, କିନ୍ତୁ, ଦାଢ଼, ହାଡ଼, ଚର୍ମ,
ଖୁରା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ
କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଜରୁରୀ ଅଭ୍ୟାର ସଙ୍କେତ
ଦେଇଥାଏ । ଏହି ଜରୁରିକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତ ଯେପରିକି ପାତି, ଆଖୁ, ନାକ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଲାକ
ନିର୍ଗତ ହେବା, ବାନ୍ଧିବେବା, ରକ୍ତ ବାହାରିବା,
ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟହେବା ଇତ୍ୟାଦି ଅସୁବିଧାକୁ
ଯଥାସମବ ଶୀଘ୍ର ଟିକିଷା କରାଇବା ଦରକାର ।

ବିଷାକ୍ତକରଣର ପ୍ରକାର
 ଅନ୍ତ୍ର ସମୟରେ ବିଷାକ୍ତକରଣ : ଏହାଦ୍ୱାରା
 ପ୍ରାଣୀମାନେ ଥିଲା କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ
 ମାତ୍ରରେ ବିଷାକ୍ତକରଣର ଶିକାର
 ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁ
 ମାତ୍ରରେ ବିଷର ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ
 ଏବଂ ଭୁରୁତ୍ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ
 ମୁୟୁବରଣ କରିଥାଆନ୍ତି ।
କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଷାକ୍ତକରଣ : ଏହାଦ୍ୱାରା
 ପ୍ରାଣୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଷାକ୍ତକରଣର
 ଶିକାର ହୋଇଥାଆନ୍ତି । କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ
 ଏହା ୧୦ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।
 ଉପମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀମାନେ
 ସୁଖ ହୋଇଥାଆନ୍ତି ।
କିଛି ମାସ ବିଷାକ୍ତକରଣ : ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ
 ପ୍ରାଣୀମାନେ ଗ ମାସ ବା ଉର୍ଧ୍ଵ ସମୟ ପରେ
 ବିଷାକ୍ତକରଣର ଶିକାର ହୋଇଥାଆନ୍ତି । ଠିକ୍
 ସମୟରେ ଏଭଳି ବିଷାକ୍ତକରଣକୁ ତିନ୍ଦଳକରି
 ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀ ସୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ।
ବିଷାକ୍ତକରଣ ଚିକିତ୍ସାର ସାଧାରଣ
 ପଳିତତ୍ତ୍ଵ : ଆନମିନି ଅଥବା ପରାକ୍ଷାମଳକ

A black and white cow with a white blaze and socks is being examined by a person wearing a blue surgical mask and gloves. The person is holding the cow's front left leg. The cow is tied with a rope around its head. The background shows a brick wall.

ଜାଣିବା ପରେ ହେଲି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ ।
ଚାଷୀମାନେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନିକଟଚାନ୍ଦ ପ୍ରାଣୀ
ଚିକିତ୍ସାକଲ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ
ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପଞ୍ଚତିକୁ
ମୂଲ୍ୟତଃ ଛ ଭାଗରେ ବିଶ୍ଵାସ କରାଯାଇଛି ।
ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା : ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରାଣୀରେ
ବିଶ୍ଵାସକରଣ ଉପକ୍ରମ ଦୂରେଇଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକ
ପିଇବା ପାଣି ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହି ପାଣିରେ
୫୦-୬୦ ଗ୍ରାମ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ
ପିଇବାକୁ ଦେବା ସ୍ଵାରା ବାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ
ଏବଂ ବିଶ୍ଵାସକରଣ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।
୨୫୦-୩୦୦ ଗ୍ରାମର ମାଗ୍ରେସିମ ସଲଫେଟ
ଅଥବା ଟେଲ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଦେବା ସ୍ଵାରା
ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟନଳୀରେ ଥିବା
ବିଷ ଖାଡ଼ା ସ୍ଵାରା ବାହାରିଯାଇଥାଏ । ପ୍ରାଣୀର
ଆଖ୍ ଏବଂ ଚର୍ମ ବିଶ୍ଵାସକରଣର ଶିକାର
ହେବା ସ୍ଵାରା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଣି
ବା ନର୍ମାଳ ସାଲାଇନ୍ ପାଣି ସ୍ଵାରା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ
ଧାନ୍ତା । ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାବା

ଟକିସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର ।
ସାଧାରଣ ବିଷ ନିରୋଧକ ଔଷଧ : ବୁଲ୍‌
ଭାଗ ଅନ୍ତିତେଚେତ୍ର ଗାରବୋଲ୍ ସମ୍ମ ଏକ
ଭାଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଏସିଥି ୧ ଭାଗ ମ୍ୟାଗ୍ରେସିଯମ
ଅଞ୍ଚାଇତ୍ର (ଯାହାକି ୧୫୦ ଗ୍ରାମ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ
ଏବଂ ୩୦ ଗ୍ରାମ ସାନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ) କୁମିଶାଇ
ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦିଆନ୍ତୁ ୨-୮ ଟି ଅଞ୍ଚାର ଧଳା ଆଶା
ସହ ୪୦୦ ମିଲି ଦୁଷ୍ଟ ମିଶ୍ରଣକରି ଖାଦ୍ୟରେ
ଦିଆଯାଇପାରିବ । ଏହା ଧାତବ ପଦାର୍ଥର
ବିଶାକ୍ତକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ୧୦୦
ମି.ଲ. ପାଶିରେ ୧୦ ବୁନ୍ଦା ଟିକ୍କର ଆୟୋତିନ
ମିଶାଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଆନ୍ତୁ । ସେହିପରି
ଅତ୍ୟଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ବିଷାକ୍ତ ଲବଣଶୁରୁ
ତୁନପିଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ ।
ବିଷାକ୍ତକରଣ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଷ
ନିରୋଧକ ଔଷଧ : ଏହିଏମ ବିଷାକ୍ତକରଣ
ପାଇଁ ସେତିଯମ ନାଇଗ୍ରାହର ଏବଂ ସେତିଯମ
ଆୟୋତିନପେଟ, ନାଇଚେତ୍ର ବିଷାକ୍ତକରଣ
ପାଇଁ ମିଆଲପିଣ୍ଡ ବ୍ୟ. ଓରୋଗାନୋ ଫଂସପେଟର

ପନ୍ଦିପରିବାରେ ଖୋଜିଲା ରୋଗର ପ୍ରତିକାର

ପିନିପରିବାରେ ବୀଜାଶୁଭ୍ରତ ଖାଉଳା
ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ
୧ ଗ୍ରାମ ସ୍କ୍ରେଟୋସାଇପିଲି ମିଶାଇ ଗଛମୂଳରେ ମୁଜ
ଭିଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ତମାଗେ, କୋରି
ଓ ଭେଷ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି ଫ୍ରେଶଲରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଟି
ଲାଗିଥିଲେ ଏହାର ଦମନ ଲାଗି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ
୩ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମାଙ୍କୋଜେବ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ବାଇଗଣରେ କାଙ୍କିଟ୍ଟିଆ ପୋକ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ
୪ ଗ୍ରାମ କାର୍ବାରିଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ
କରନ୍ତୁ । ବର୍ଷାଦିନେ ବାଇଗଣରେ କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳପତନ
ରୋଗ ଲାଗିବା ବହୁ ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଏହାର ପ୍ରତିକାର
ସକାଶେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ମି.ଲି. ହିସାବରେ
କପର, ଅଞ୍ଚିକୋରାଇଦ୍ଵାରା କିମ୍ବା ବୋତାକୁ ମିଳୁଛିବା
(୪:୪:୪) ହିସାବରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କଖାରୁ
ଜନ୍ମି, କାକୁଡ଼ି ଜାତୀୟ ଫ୍ରେଶଲରେ ଫଳମାଛି ଦମନ ଲାଗି
୧ମ.ଲି. ମାଲାଥୁଅନ୍ତର ସହ ୨୦ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼କୁ ୧ ଲିଟର
ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବିଷଠୋପ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ଆଧ୍ୟତ୍ରରାଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଦିନିଆ ଫୁଲକେବି କିଷମ ଯଥିଲା
- ହେମଲତା ତଳି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ କିଆରିରେ
ରୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଶାଉଳା ସହିତ ଥିବା ଲଙ୍କାମରିଟ କିଷମ
ଯଥା ଉଚ୍ଚକ ରକ୍ଷି, ଉଚ୍ଚକ ଆଭା ଲଗାନ୍ତୁ । ଲଙ୍କାଟେ
ଛକ୍ଷଣିଆ ପୋକ ଦେଖାଗଲେ ପନ୍ଥମୋରା ହୋଇଯାଏ



କପାରେ ବକରା
ମୋତ ଚାରିଟେ

କପାରେ ଚିତ୍ରିତ ବକରା/
ପାଟଳ ବକରା ପୋକ ଲାଗିଲେ
୨.୪ ମି.ଲି. ଗ୍ରାଇଆଜୋଏସ୍-
୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଲାଇ
ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ତା' ପରେ
କାଟ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିଲେ
ଇନ୍ଦ୍ରାଜ୍ଞାକାର୍ବ ପ୍ରତି ୨ ଲିଟର
ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ହିଂସାବରେ
ଗୋଲାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ
କରାଯାଇପାରେ । ସକାଳ ଟାଙ୍କା
ପରେ (କାକର ଶୁଖିଲା ପରେ)
କପା ତୋଳନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ ଥର
ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ତୋଳାଯାଇଥିବା
କପାକୁ ଅଳଗା ରଖୁ ଶୁଖାଇ
ସଫାକରି ଶୁଖିଲା ଘ୍ରାଣ୍ଡିକ



ବ୍ୟାକ ଅମ୍ବଳ ସମ୍ପଦ

ଧାନକେଷ୍ଟା ଶତକଡ଼ା ୮୫ ଭାଗ ପାରିଯାଇଥିଲେ ତାକୁ କାଟି ଖରାରେ ଶୁଣାଇ ଅମଳ କରନ୍ତୁ । ତେରିରେ ରୁଆଯାଇଥିବା ଧାନ ୨-୩ ସପ୍ତାହର ହୋଇଥିଲେ ଘାସ ବାଛି ହେବୁର ପ୍ରତି ୩୦ ରୁ ୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସବକ୍ଷାରଜାନ ଖାଦ୍ୟସାର ପିଲ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ବିଳମ୍ବରେ ପକାଯାଇଥିବା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଶାୟ ରୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ୧୫ରୁ ୨୦ସେ.ମି. ଓ ବୁଦାକୁ ବୁଦା ୧୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ । ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଓ ବିଳମ୍ବ କିସମ ଧାନ ଲିଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆରଥିଥିଲେ ହେବୁର ପ୍ରତି ୧୫ ରୁ ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସବକ୍ଷାରଜାନ ଖାଦ୍ୟସାର ଥୋଡ଼ାସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁଲ ଉଡ଼େଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିରେ ୪ x ୨ ସେ.ମି. ଠିଆ ପାର୍ଶ୍ଵ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଧାନ ବିଳମ୍ବ ଗନ୍ଧିପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ହେବୁର ପ୍ରତି ୨୫ କି.ଗ୍ରା. କୌରପାଳଗିପାନ ଗୁଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟାଦିନ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । କାଣ୍ଡିବିଶା ପୋକ ଦମନ ପାର ପିପେନିଲ୍ ୦.୩ %, ଦାନାଦାର ହେବୁର



ପାତ୍ରିକା

ଏକ ହେତୁର ବିଶିଷ୍ଟ ମାଛପୋଖରୀର ୧୨,୪୦୦ ଯାଆଁଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ୩ କି.ଗ୍ରା. ୭୪୦ ଗ୍ରାମ କାଣ୍ଡିଆକୁଣ୍ଡା ଓ ୩ କି.ଗ୍ରା. ୭୪୦ ଗ୍ରାମ ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ ମିଶାଇ ସମୁଦ୍ରାୟ ଦେନିକ ୩ କି.ଗ୍ରା. ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ପୋଖରୀର ନିମ୍ନ ପ୍ରରତେ ଥିବା ମିରିଜଳି ଓ ବିଲାଟି ରୋହି ଉପରସ୍ତରକୁ ଉଠିଲେ । ଓ ପୋଖରୀ ତଳମାଟିରୁ ଦୂର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲେ ପ୍ରତି ହେତୁର ମିଟର ପାଶିରେ ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଜିଓଲାଇର ବ୍ୟବହାର କରିବ । ଶାନ୍ତିନି ମାରମ୍ବ ମୋଖରୀରେ ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ବନ୍ଦ ଘନ ଓ ଲାଙ୍ଘ ପଚା ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଲାଗୁ ପଞ୍ଚ ୧.୫ ମି.ଗ୍ରା. ଦୁଇଆକୁ ଜଳରେ ମିଶାଇ ମାଛକୁ ୨ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ । ଆଖୁପଚା ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଲିଟର ପିଣ୍ଡା ୮ ରୁ ୧୦ ମି.ଗ୍ରା. କୋରୋମାଇସେଟିନ ଜଳରେ ଦ୍ରୁବୀଭୂତ କରି ମାଛକୁ ଦିନକୁ ୨ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ରଖନ୍ତୁ । ଏପରି ୨ରୁ ଗା ଦିନ କରିବେ । ପଚା ଗା' ଗୋଟିଏ ୨ ଲିଟର ପାଶିରେ ୧ ଗ୍ରାମ ଦୁଇଆ ମିଶାଇ ମାଛକୁ ପ୍ରତିଦିନ ୧ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗାରୁ ୪ ଦିନ ରଖନ୍ତୁ । ଏଥୁଥିମାଛକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି ୩୦ ଗ୍ରାମ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେଥିରେ ୫ ରୁ ୧୦ ମିନିଟ୍ ମର୍ମ୍ୟକ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଲ ରତ୍ନ ।

