



ମିଶନ
ଶକ୍ତି
ସମ୍ମାନ ମହିଳା | ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶା



ଗତିଶୀଳତା ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ

ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍କୁଟର ଯୋଜନା

- ₹ 528 Cr.
ସ୍କୁଟର ଯୋଜନା ସୁଧ ଛାଡ଼ି
- ₹ 250 Cr.
ଜିପିଏଲ୍‌ୱେପ୍ ଅପିସ ଗୃହ
- ₹ 150 Cr.
2.5 ଲକ୍ଷ ଏସ.୬୮.ଜିଙ୍କୁ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ
- BLF ଓ DLF ନିମନ୍ତେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା

ସମ୍ମାନ ମହିଳା | ସମ୍ମାନ ଓଡ଼ିଶା



ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

କୁଳାଙ୍ଗାର୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଟିକା

A photograph showing a large group of white chickens with prominent red combs and wattles. The chickens are densely packed, filling the frame. They appear to be young birds, possibly at a farm or market.




ବାଇଶଶରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପୋକ ପରିଚାଳନା

କାଇଗଣରେ ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡିକିଷା ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ସମନ୍ତିତ ପୋକ ପରିଚାଳନା ପଞ୍ଚଟି ଅନୁସାରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦,୦୦୦ ଟ୍ରାଙ୍କୋଗ୍ରାମୀ ପରାଶ୍ରୀୟା କାଟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ନହେଲେ ୩୦୦ପିଯିଏମ୍ ନିମଜ୍ଜାତ କୀଟନାଶକକୁ ଏକର ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଥଥବା ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ଗ୍ରାମ କାର୍ବାରିଲ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଖାରୁ ଜାତୀୟ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଲ ଓ କଳା କଖାରୁ ଭୁଲ୍ଲ ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦୦ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କାର୍ବାରିଲ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷାମରିତ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଲ ଦମନ ପାଇଁ ଏହାର ଦମନ ସକାଶେ ପ୍ରତି



ଡାକ୍ତିରି ପାଇଁ ପାଇଁ

ଏକ କି.ଗ୍ରା. ଡାଳିଙ୍ଗତୀଯ ବିହନ ପିଛା କାର୍ବେନ୍ଟିନ
 $73.8\% \times$ ଥରାମ୍ ୩୩.୪% ମିଶ୍ରିତ ତିଥେ
 ପିସିନାଶକ ବିଷ ୨ ଗ୍ରାମ୍ ଗୋଲାଇ ବିହନ ବୁଣ୍ଡୁ।
 ହେଲ୍କ୍ର ପ୍ରତି ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ବିହନରେ ୪୦୦ ଗ୍ରାମ୍
 ରାଇଜେବିଯମ୍ ବାଜାରୁ କଳନ୍ତର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
 ବିହନକୁ ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣ୍ଡୁ । ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୩୦
 ସେ.ମି. ସ୍ୟାର୍ଥାନ ରଖନ୍ତୁ । ଜିମିକୁ ଡଳ ଭାବରେ
 ଗାଷ କରି ହେଲ୍କ୍ର ପିଛା ୧୦/୧୨ ଶଗଡ଼ ଶଡ଼ା
 ଗୋବରଖତ ବା କଞ୍ଚେଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ମୁଗ,
 ବିରିପାଇଁ ହେଲ୍କ୍ର ପ୍ରତି ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ,
 ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ପଥଫେଟ୍ ଓ ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ପଶାଘ ଏବଂ
 ମଟର ପାଇଁ ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୪୦
 କି.ଗ୍ରା. ପଥଫେଟ୍ ଓ ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ପଶାଘ ସାର




ପ୍ରାଣୀପାଦିକ୍ଷା ବିଷାକ୍ତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ



ଜ୍ଞାନୀଦି । ଏଥୁଯୋଗୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଯେପରିକି, କୃଷି ସାର : ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାର କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାର ଏବଂ ରସାୟନ ପଦାର୍ଥ, କାଟମାଶକ ଦ୍ରୁବ୍ୟ, ମୂଳା ମାରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁବ୍ୟ, କଳକାରମାନାରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଦୂଷିତ ଦ୍ରୁବ୍ୟ ଏବଂ ବିକିରଣ ବିପଦ । ଜ୍ଞାନ ପୁର୍ବକ ବିଶ୍ଵାସ୍ତକରଣ : ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ ବିଶ୍ଵାସ୍ତକରଣ କରାଇବା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଞ୍ଚ, ଯକ୍ତୁଡ଼, କିନ୍ତୁମୀ, ବାନ୍ଧ, ହାଡ଼, ଚର୍ମ, ଖୁରା ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଜରୁଣୀ ଅଥିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ । ଏହି ଜରୁଣୀକାଳୀନ ପରିପ୍ରିତ ଯେପରିକି ପାଟି, ଆଖି, ନାକ ଜ୍ଞାନୀଦ୍ୱାରା ଲାଲ ନିର୍ଗତ ହେବା, ବାନ୍ତିହେବା, ରକ୍ତ ବାହାରିବା, ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟହେବା ଜ୍ଞାନୀ ଅଥୁବିଧାକୁ ଯଥାସମ୍ବନ୍ଧ ଶାୟିରେ ଟିକିଥା କରାଇବା ଦରକାର ।

A woman with long dark hair tied back, wearing a white short-sleeved lab coat over a red patterned top and a blue surgical mask, is milking a black and white cow. The cow is tied with a yellow rope. They are in a barn setting with a brick wall in the background.

ପନ୍ଦିପରିବାରେ ଛୋଟଙ୍କା ରୋଗର ପ୍ରତିକାର

ପନ୍ଦିପରିବାରେ ବାଜାଶୁଭ୍ରତ ଖାଉଁଲା ରୋଚ
ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିଟେ
୧ ଗ୍ରାମ ସ୍କେଟୋସାଇଲିନ୍ ମିଶାଇ ଗଛମୂଳରେ ମୂଳ
ଭିଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ତମାଗେ, କୋମିଶି
ଓ ଭେଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଫ୍ରେଶଲରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଚ
ଲାଗିଥିଲେ ଏହାର ଦମନ ଲାଗି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିଟେ
୩ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମାଙ୍କୋଜେର ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ବାଇଗଣରେ କାଙ୍କିତିଆ ପୋକ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ
୪ ଗ୍ରାମ କାର୍ବାରିଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ
କରନ୍ତୁ । ବର୍ଷାଦିନେ ବାଇଗଣରେ କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳପର
ରୋଗ ଲାଗିବା ବହୁ ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଏହାର ପ୍ରତିକାଟ
ସକାଶେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ଗ୍ରାମୀନ ହିସାବଟେ
କପର, ଅନ୍ତିକ୍ଷେତ୍ରର କିମ୍ବା ବୋଟାକ୍ଷେ ମିକ୍କଟଟ
(୪:୪:୪) ହିସାବରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କଖାରୁ
ଜନ୍ମି, କାକୁଡ଼ି ଜାତୀୟ ଫ୍ରେଶଲରେ ଫଳମାତ୍ର ଦମନ ଲାଗିବା
୧ମି.ଲି. ମାଲାଥାନ୍ ସହ ୨୦ ଗ୍ରାମ ରୁକ୍ତି ଏ ଲିଟର
ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବିଷଥୋପ କର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ଆଭ୍ୟନ୍ତରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ତିମିଆ ଫୁଲକେବିକିସମ ଯଥା
- ହେମଲତା ତଳୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ କିଆଗିଲେ
ରୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଖାଉଁଲା ସଥଣି ଥିବା ଲଙ୍କାମରିତ କିସମ
ଯଥା ଉଚ୍ଚଳ ରଣ୍ଟି, ଉଚ୍ଚଳ ଆଭା ଲଗାନ୍ତୁ । ଲଙ୍କାଟେ
ଦେଖିଲୁ ହୋଇ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁମା ହୋଇଲୁମା



ଚିହ୍ନକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର ।
ସାଧାରଣ ବିଷ ନିରୋଧକ ଔଷଧ : ଦୁଇ
ଭାଗ ଅନିକେଟେଟ ଚାରକୋଲି ସହ ଏକ
ଭାଗ ଚନିକ ଏଥିତ୍ତ ୧ ଭାଗ ମ୍ୟାଗ୍ରେସିଯମ
ଅଞ୍ଚଳକୁ (ଯାହାକି ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ
ଏବଂ ୩୦ ଗ୍ରାମ ସାନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ)କୁ ଦିଶାଇ
ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦିଆନ୍ତୁ ୨-୮ ଅଣ୍ଟାର ଧଳା ଅଂଶ
ସହ ୪୦୦ ମିଲି ଦୁଇ ମିଶ୍ରଣକରି ଖାଦ୍ୟରେ
ଦିଆଯାଇପାରିବ । ଏହା ଧାଉର ପଦାର୍ଥର
ଦିଶାକୁରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ୧୦୦
ମି.ଲି. ପାଣିରେ ୨୦ ମୁଦ୍ରା ଚିକର ଆୟୋତିନ
ମିଶାଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପୁଲକା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ । ସେହିପରି
ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଲଜାତୀୟ ବିଷାକ୍ତ ଲବଣୀକୁ
ବୁନପାଣି ଦ୍ୱାରା ନିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ ।
ବିଷାକ୍ତକରଣ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷ
ନିରୋଧକ ଔଷଧ : ଏହିଏମ ଦିଶାକୁରଣ
ପାଇଁ ସୋଡ଼ିଯମ ନାଇଟ୍ରୋଇଡ୍ ଏବଂ ସୋଡ଼ିଯମ
ଆୟୋସଲଫ୍ରେଟ, ନାଇକ୍ରେଟ ବିଷାକ୍ତକରଣ
ପାଇଁ ନିଥାଇଲ କ୍ଲ୍ରୁ, ଓରୋଗାନୋ ଫ୍ରେଟ

ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ସାସା ହାରା ବିଶାଳକରଣ
ପାଇଁ କ୍ୟାଲ୍‌ସିଯମ ଡାଇସୋଡ଼ିଯମ ଇଡ଼ିଆ
ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

ବିଶାଳକରଣର ଲାକ୍ଷଣିକ ଚିକିତ୍ସା :
ବିଶାଳକରଣର ଲକ୍ଷଣକୁ ନଜରରେ ରଖି
ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ । ହେଲେ
ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଣ ଚିକିତ୍ସାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ନେବା ନିହାତି ଜୁଗୀ ।

➤ ପ୍ରଥମତଃ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର
ବାଧା ଦୂରକରିବା ।

➤ କିଛି ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟାର ଠିକ୍ ମାତ୍ରା
ପାଇଁ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟା ଉତ୍ତେଜକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଇଥାଏ ।

➤ ଶରୀର ଆଲୋଡ଼ନକୁ ଶାନ୍ତକରିବା ଦ୍ରବ୍ୟ
ଯେପରିକି ଡାଯାଜେମୋସ ଲଞ୍ଜେକସନ
ଦିଆଯାଇଥାଏ ।

➤ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ତେଜନ କରିପାରିବା ଭଲି
ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେପରି କାଫେଇନ ବ୍ୟବହାର
କରାଯାଇପାରିବ । (କମଶଣ୍ଟଃ..)

କପାରେ ବକରା ମୋ ଦାରିଦ୍ର

ଶ୍ରୀ କୃତ୍ତବ୍ୟାନିକ ସମ୍ପଦଗୁଡ଼ିକ

ଧାନକେଷ୍ଟା ଶତକଡ଼ା ୮୫ ଭାଗ ପାଠିଯାଇଥିଲେ ତାକୁ କାଟି ଖରାରେ ଶୁଣାଇ ଅମଳ କରନ୍ତୁ । ତେରିରେ ରୂଆଯାଇଥିବା ଧାନ ୨-୩ ସପ୍ତାହର ହୋଇଥିଲେ ଘାସ ବାଛି ହେବୁର ପ୍ରତି ୩୦ ରୁ ୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଖାଦ୍ୟସାର ପିଲ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ବିଳମ୍ବରେ ପକାଯାଇଥିବା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଶାୟ ରୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଧାଢ଼ିକି ଧାଢ଼ି ୧୫ରୁ ୨୦ସେ.ମି. ଓ ବୁଦ୍ଧାକୁ ବୁଦ୍ଧା ୧୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ । ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଓ ବିଳମ୍ବ କିସମ ଧାନ ଲିଙ୍ଗ ସଞ୍ଚାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥିଲେ ହେବୁର ପ୍ରତି ୧୫ ରୁ ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଖାଦ୍ୟସାର ଥୋଇବାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁଲ ଉଡ଼େଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିରେ ୪ x ୨ ସେ.ମି. ଟିଆ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଧାନ ବିଳରେ ଗର୍ଷିପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ହେବୁର ପ୍ରତି ୨୫ କି.ଗ୍ରା. କୋରପାଇପାଇସନ୍ ରୁଣ୍ଡ ସୁର୍ଯ୍ୟାବନ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । କାଣ୍ଡବିଶା ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ପିପେନିଲ୍ ୦.୩ % ଦାମାଦାର ହେବୁର



ପାତ୍ରଙ୍କିଣୀ

ଏକ ହେତୁର ବିଶିଷ୍ଟ ମାଛପୋଖରୀର ୧୭,୫୦୦ ଯାଆଁଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଥା କି.ଗ୍ରା. ୩୪୦ ଗ୍ରାମ କାଞ୍ଚିଆକୁଣ୍ଡା ଓ ଥା କି.ଗ୍ରା. ୩୪୦ ଗ୍ରାମ ବାଦାମ ପିଢ଼ିଆ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ ଦୈନିକ ୩ କି.ଗ୍ରା. ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ବାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ପୋଖରୀର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ମିରିକାଳି ଓ ବିଲାତି ଗୋହି ଉପରସ୍ତରକୁ ଉଠିଲେ ଓ ପୋଖରୀ ଚଳମାଟିରୁ ଦୂର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲେ ପ୍ରତି ହେତୁର ମିଗର ପାଣିରେ ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଜିଓଲାଇଟ ବ୍ୟବହାର କରିବ । ଶୀଘ୍ରରେ ମାରମର ମୋଖ୍ୟରୀରେ ୧୦ ଲି ମା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରିବ ।



