




The logo consists of the lowercase letters 'ts' in a bold, sans-serif font. The letter 't' is blue and positioned above the letter 's', which is green. A horizontal black bar extends from the bottom of the 's' across to the right.



DSPL - 404

**ଶ୍ରୀମିକ ସ୍ନାନାନ୍ତରଣ ରୋକିବା ଓ
ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି
ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ
ଆଉ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ**

“କ୍ଷେତ୍ର ସପୋର୍ଟ ରୁ ମହାଯ୍ବା ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା”
ଆଉ ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ଟି କୁକୁକୁ ସମ୍ପର୍କିତ

ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଓ କୁଳଃ

ଜିଲ୍ଲା	ବୁଦ୍ଧ
ଗଜପତି	ମୋହନା, ନୂଆଗଡ଼
କଣ୍ଠମାଳ	ପିରିଣ୍ଣିଆ, ବାଲିଗୁଡ଼ା
କୋରାପୁଟ	ବୋରିଗୁନ୍ଧା, ଦଶମନ୍ତପୁର
ନବରଙ୍ଗପୁର	ଛରିଗଁ, ପାପତାହାଣ୍ଡି
ରାୟଗଡ଼	କାଶୀପୁର, କଳ୍ପନାର୍ଥିହପୁର

୨୯୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଜାର ୩୮୮ ପରିବାର ଓ ୩ ଲକ୍ଷ ୮୩ ହଜାର ୮୭୭ ଶ୍ରମିକ ହେବେ ଉପକୃତ

ମନରେଗା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ :

- ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଞ୍ଜୁରି ପ୍ରଦାନ
 - ୩୦୦ ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି
 - ପ୍ରଥମ ୧୦୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେନିକ ୧୧୪ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ମଞ୍ଜୁରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ
 - ଦେନିକ ୩୫୭ ଟଙ୍କା ହାରରେ ୨୦୦ ଦିନର ଅତିରିକ୍ତ ଶମ ଦିବସ ଯୋଗାଣ

ଗ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ର

ସାଧାରଣ ଭାବେ ନଦ୍ଦିଆ ତେଲ ବସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗହମ ବୁଶା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ । ଆଖ୍ୟତରାଣ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରିକ୍ଟରେ ବିଳମ୍ବରେ ଗହମ ବୁଶାଯାଇପାରିବ । ଗହମ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ଥତି କରନ୍ତୁ । ଅଧିକ ଅମଳକମ ଗହମ ବିହନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି - ଗୋନାଲିଙ୍କା, ପି.ବି.ଡ୍ରୁୟ-୧୪୩୪, ପି.ବି.ଡ୍ରୁୟ-୧୪୩୩, ମୂପି.-୨୭୭, ଏଟ୍ରି.-୨୭୫୪ ଅବି ବିହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ । ହେବୁର ପ୍ରତି ୧୨୪ କି.ଗ୍ରା. ବିହନକୁ କାର୍ବେଣ୍ଟିମ୍ (କେ.କି. ପ୍ରତି ୨ ଗ୍ରାମ) ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷାଧିତ କରି ଧାତିକୁ ଧାତି ୨୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ୮୦:୪୦:୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଅନୁମୋଦିତ ସାରର ଅଧା ଯବକାରକାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିପରା ଓ ପରାସ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବୁଶନ୍ତୁ । ଏହି ଚାଷରେ ଘାସ ନିଯନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପେଣ୍ଟିମେଥାଲିନ୍ ହେବୁର ପିଣ୍ଡା ୧ କି.ଗ୍ରା. (ଏକ ହେବୁର ପାଇଁ ମାତ୍ରମାତ୍ର ମି.ଲି. ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ୩୦ ଇ.ସି.) ହିସାବରେ ୧-୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ପ୍ରମାଣିତ

ଗୋଲାପ ଫୁଲଗଛର ପୁରୁଣା ଡାଳସବୁ କାଟି ଦିଆନ୍ତିରୁ । କଟା ଅଗରେ ବୋର୍ଡୋପେଷ୍ଟ ଲଗାନ୍ତିରୁ । ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଛୁଟିଆ ଓ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଶିଥ ଦୂନକୁ ଏ ଲିଟର ପାଣିରେ ମଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲଗାନ୍ତି । ଗଛରେ ନୂଆପତ୍ର ବାହାରିଲେ ଗଛ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ଯବଶାରଜାନ, ୧୦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚପରିଷ ଓ ୧୫ ଗ୍ରାମ ପରାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି । ବର୍ଷା ଯୋରୁ ଗୋପୁଲୁ ଗଛ ଲଗାଇ ନ ଥିଲେ ବର୍ଷାମାନ ଲଗାନ୍ତି । ସିରାକୋଳ, ଆପ୍ରିକୋଳ ତତ୍କୁ ଜୀବାଣୁ ଥରେଣ୍ଡ, ଆପ୍ରିକୋଳ ତତ୍କୁ ଜ୍ୟାଏସ୍ ଯେଲୋ, ପୁଷ୍ଟା ବାସନ୍ତୀ ଆଦି ଉନ୍ନତ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଗ୍ଲାଡ଼ିଓଲି କନାରୁ ଓଡା ବାଲିରେ ଗଜା କରି ଲଗାନ୍ତି । କନା ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତି । ପ୍ରେଷ୍ଟେରିପ, ପ୍ରେଷ୍ଟେରିପ ଫ୍ଲାଇଟ, ପିଚର ପିଯାରିଷ, ରେତ ବିଚିତ୍ର, ନୋଟାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହରମାଙ୍ଗସ୍ତ୍ର, କ୍ଲାକ ଜ୍ୟାକ, ଚେକିଲ୍‌ସମ, ଅର୍ଜନା, କିନ୍ତିଆ, ଧର୍ମକରୀ, ଦର୍ଶନ ଆଦି ଉନ୍ନତ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଗ୍ଲାଡ଼ିଓଲି ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ।



ଗାନ୍ଧିଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ସମସ୍ୟା ଓ ପୁଣିକାର



ରହିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଥର ବାଲ୍ମୀରି
ଜନ୍ମ କରିବାର ବ୍ୟବଧାନ ୯୦-୧୦୦
ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗାଇ ଗର୍ଭଧାରଣ ନ
କରିଲେ ୪୦-୫୫ ଶତକତା ଆର୍ଥିକ
କ୍ଷତି ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ଗୋଠରେ ୫୫ ଶତକତାରୁ ଅଧିକ
ଗାଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନକିମ୍ବ
ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଭୁଲ ପରିଚାଳନା ହଁ
ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ଏହାକୁ ପ୍ରାଣୀ
ଟିକିସିକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ହଁ ଠିକ୍
କରାଯାଇପାରିବ । ପ୍ରଜନନ କ୍ୟମତା
ହଁ ୧୦୦୦୦ ପ୍ରାଣୀରେ ଏହି

9. ଶରାରରେ ମୁଖ୍ୟତ ସହ ଜତିତ ଥିବା ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ
କରିବା ରୋଗ : ଏହି ପ୍ରକାର
ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଜନନ ଉପରେ
ପକାଇଥାନ୍ତି । ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ
ଗ୍ରାଜକୋମୋନିଆସିୟ, ବ୍ରୂଷେଟେ
ଭିନ୍ନୀୟେସି ଲାଭ୍ୟାଦି । ଏହି ତେ
ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜନନ
ଅଙ୍ଗରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ହଁ
ହେବା ସହ ଅଞ୍ଚିତମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା
ଗ୍ରାଜକୋମୋନିଆସିୟ
ମାଧ୍ୟମରେ । ଏହି

A photograph of a brown and white cow standing in a green pasture. The cow has large white patches on its brown coat and is wearing a white plastic collar with a yellow identification tag. In the background, there is a fence and a line of trees under a clear sky.



ମୁକ୍ତନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବସିବାସ କରନ୍ତି
କ୍ରାନ୍ତି ଗାନ୍ଧିମାନଙ୍କ ପରି ଶୁଳ୍କ ଶିଖମାନଙ୍କଙ୍କ
ରାଗ କୌଣସି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶିର୍ଷ
ଆବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି
ରାଶି-
ଯିସ୍ତ, ରୋଗ ଚିରଜ୍ଞାୟୀ ହୋଇ ରହିଯାଏ
ନାରେ
ଜନିତ ଲକ୍ଷଣ : ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିତିର
ସ୍ଵର୍ଗିତ ହେଲା-ଗର୍ଭାଶୟରେ ପୂଜ ହେବା ଏବଂ
ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୂଜା ବାହାରକୁ ନିର୍ଗ୍ରହ
ହେବା, ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାରେ ଅସମାନ
ହେବା ଏବଂ ୧-୧୭ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ
ସ୍ଵର୍ଗିତ ହେବା । ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଶାଳୀଟେ
ଏହି ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମରେ ଏବଂ

ହେଉଥିବା ଲାଳକୁ ଅଣୁଗୀକଶ ଯନ୍ତ୍ର
ଦ୍ୱାରା ପରିକ୍ଷା କରିଲେ, ଏହି ରୋଗ
ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ । ଏହି
ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୋଠରେ
ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଜନନ ବଦ କରିବା ନିତାନ୍ତ
ଆବଶ୍ୟକ । କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରିବା
ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗରୁ ମୁଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ ।
ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଗରାଶୟ ଭିତରକୁ
ଲୁଗୋଲସ୍, ଆୟୋତିନ୍/ସୋତିଯମ
ପରବୋରେଟ୍/କୋରିନ୍/ଆକ୍ରିଫ୍ଲୁଭିନ୍
ପୂରାଇ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାଆନ୍ତି ।
ଭିକ୍ରିଯୋସିୟ: ଗାଇମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି
ରୋଗ ଯୌନ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ।
ଏହି ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭିକ୍ରିଓ
ପିରସ ଭେନେରିଆଲିସ୍ ଅଟେ । ପ୍ରଥମ
ଥର ଏହି ରୋଗକୁ ମ୍ୟାକିପାଡ଼ିଯାନ
ଏବଂ ମୁଣ୍ଡାନ୍ ୧୯୧୦ ଏବଂ
୧୯୧୩ରେ ମେଘ୍ୟ ଏବଂ ଗାଇଠାରେ
ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଣୁଗୀବ ମଧ୍ୟ
ଗାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ସହ ଜତିତ
ଅଙ୍ଗ, ଭୂଶା, ଲାହି ନାତ ଲତ୍ୟାଦିରେ
ବସବାସ କରିଥାଏ । ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଜନନର
ଦ୍ୱାରା ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଣୁଗୀବ
ଗର୍ଭାଶୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ।

ଲକ୍ଷଣ

- ଯୋନି ଦ୍ୱାରରୁ ଗରମ ସମୟରେ
ଅଧିକ ଏବଂ ଅଳଗା ପ୍ରକାରର ଲାଲ
ନିର୍ଦ୍ଦତ ହେବା ।
- ଗର୍ଭ ନ ରଖୁବା ଏବଂ ଛାଅ ମାସରୁ
ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧ୍ୟାଗୁଣ ପରିଲକ୍ଷିତ
ହେବା ।
- ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର
ସଙ୍ଗମ କରିବା ।
- ଦୁଇଟି ରତ୍ନକ୍ରୂ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ
ବୃଦ୍ଧି ହେବା ।
- ବିଳମ୍ବିତ ଗର୍ଭପାତ ହେଲେ ନାହିଁନାହିଁ
ବାହାରକୁ ନ ଆସିବା ଏବଂ ନାହିଁନାହିଁ
ଧୂସର ପଡ଼ିଯିବା । (କ୍ରମଶଃ..)

ମାଛ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ମରାମତ

ମାଛ ପୋଖରୀ ଦୁଡ଼ାକାଙ୍ଗି ଯାଇଥୁଳେ
ଦୂରତ୍ତ ମରାମତି କରନ୍ତୁ । ଏକ ହେଙ୍କୁର
ବିଶିଷ୍ଟ ମାଛପୋଖରୀର ୧୯୪୦୦
ଜାର୍ଥିଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ୩ କି.ଗ୍ରା. ୭୫୦
ଗ୍ରାମ କଣ୍ଠିଆ କୁଣ୍ଡା ଓ ୩ କି.ଗ୍ରା. ୭୪୦
ଗ୍ରାମ ବାଦାମ ପିଣ୍ଡିଆ ମିଶାଇ ସମ୍ମାନ
ଦେଖିବାକୁ ୩ କି.ଗ୍ରା. ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ଦାନା
ଖାଇବାକୁ ଦିଆନ୍ତୁ । ପୋଖରାର ନିମ୍ନ
ସ୍ଥରରେ ଥିବା ମିରିକାଳି ଓ ବିଲାତି ରୋହି
ଉପରସ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଓ ପୋଖରୀ
ଜଳମାଟିରୁ ଦୂରତ୍ତ ବାହାରୁଥିଲେ ପ୍ରତି
ହେଙ୍କୁ ମିଚର ପାଣିରେ ୪୦ କି.ଗ୍ରା.
ଜିଓଲାଇର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଶାତଦିନ
ପ୍ରାରମ୍ଭ ପୋଖରାରେ ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଦୂନ
ସହିତ ୪ କି.ଗ୍ରା. ହଳଦାରୁଗୁଡ଼ ମିଶାଇ
ଦୁଇଟି କିମ୍ବରେ ୧ ମାସ ଅନ୍ତରରେ
ପକାଇଲେ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଲ
ନ ଥାଏ । ପକ୍ଷ ଓ ଲାଞ୍ଚ ପାଶ ରୋଗ
ହେଲେ ଲିଟର ପିଣ୍ଡା ୧.୫ ମି.ଗ୍ରା.
ଦୁଇଥାରୁ ଜଳର ମିଶାଇ ମାଛଙ୍କୁ ୨
ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ । ଆଖୁପଶ ରୋଗ
ହେଲେ ଲିଟର ପିଣ୍ଡା ୮ ରୁ ୧୦ ମି.ଗ୍ରା.
କୋରୋମାକୁ ସେଟିନ ଜଳର ଦବାଭତ

8

ମୁକ୍ତିଆଷ୍ଟ୍ରର ଯତ୍ନ

ଜମିରୁ ଶୁଷ୍କଳା ପଡ଼ି ବାହାରକରି
କେତେକୁ ପରିଷାର କରନ୍ତୁ । ଆଖୁ
ଶୁଷ୍କାକୁ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଚାଷକରି
ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତୁ । ଏହା ଫଳରେ



ପିଥାଜ କେମି ପ୍ରକୃତ



କି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏକ
ହେକ୍ଟାର ଜମିପାଇଁ ୫୦୦
ବର୍ଗମିଟର ପରିମିତ ଜମିରେ
ତଳି ପକାନ୍ତୁ । ତଳି ପଚାଳି
ମିଠାରୁ ଗଛ ଉଚ୍ଚ, ୧ ମିଟର ଓପାର
ବାବୁ ମୁଦ୍ରିବା ଅନୁଯାୟୀ ଲମ୍ବ ହେବା
ବାବଶ୍ୟକ । ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଭଲ ଶିଢ଼ା
ଖଲା ଗୋବର ଖତ ସହ ୧ କି.ଗ୍ରା.
ଶୁଙ୍କକୋଡ଼ମା ଭରିଦେ ଜାବାଶୂନ୍ୟାର
ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ୨-୩ ଦିନ
ପାଇରେ ପଳିଥିନ୍ଦ୍ର ଘୋଡ଼ାଇ ରଖି ତଳି
ପଚାଳିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଶେଷାଧିତ
ହମନ ଧାର୍ତ୍ତରେ ବୁଣ୍ଟି । ତଳିକୁ ଅବିନିଆ
ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାଁଶ କାଠି

ପ୍ରେମରେ ଜରି ଲଗାଇ ବର୍ଷାବେଳେ
ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ । ଜଳ ନିଷାଧାନ
ପାଇଁ ପ୍ରତି ତଳି ପଚାଳି ମଞ୍ଚିରେ ୧ ପୁଣ୍ଡ
ଓସାର ନାଳ ରଖନ୍ତୁ । ତଳି ୮-୧୦
ସପ୍ତାହ ହୋଇଥିଲେ ଜମିରେ ରୋପଣ
କରନ୍ତୁ । ହେବୁ ପିଛା ରୁ ୧୦ କି.ଗ୍ରା.
ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ । ଏତି ଫାଉଛୁ ଲାଇର
ରେଡ଼, ଏନ୍-୫୩, ଭାମା ସୁପର,
ଭୀମା ଶକ୍ତି ଆଦି ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ
ବିହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କରନ୍ତୁ । ହେବୁ ପିଛା
୧୨୦:୧୦:୨୦:୪୦ କି.ଗ୍ରା । ହିସାବରେ
ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫଂସରସ, ପଚାଶ ଓ
ସଲମର ସାରରୁ ହୁଇବି କିମ୍ବାରେ ପ୍ରୟୋଗ
କରନ୍ତୁ । ତଳି ରୋଇବା ବେଳେ ମୂଲସାର

ହିସାବରେ ଉଭୟ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏବଂ
ଫଂସରସ ସାରର ଅର୍ଜନ ଏବଂ
ସମ୍ବାଦ ପଚାଶ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ
। ନଭେମ୍ବର ମାସ ୨୦ ତାରିଖରୁ
ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁନ୍ଦା ପିଆଜ
ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରନ୍ତୁ ।
ଘାସମରା ଅଷ୍ଟଧ, ପେଣ୍ଟମୋଟାଲିନ୍
୩୦ ଏ.ଇ.କ୍ରୁ ତଳି ରୋଇବାର ଦୁଇ ଦିନ
ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ହୋଇପାରିବ । ତଳି ରୋଇବାର ୧୪
ଦିନ ପରେ ନିମ୍ନ ସିଦ୍ଧ କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ ଏକଗ୍ରାଙ୍କ
ଦ୍ରବଣକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି ୪ ମି.ଲି. ହିସାବରେ
ଫଂସର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପତ୍ର ଉଚ୍ଛରଣ
(ଥ୍ରୀସ୍) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

00160 00160 000

କଣ୍ଠାବୀରଧାରା ଧରି
ଚିତ୍ରିତ ବକରା/ପାଟଳ ବକରା ପୋକ
ଲାଗିଲେ ୨.୫ ମି.ଲି. ଶ୍ରୀଅଜ୍ଞାପନସ୍ବା
୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଲାଇ ସିଞ୍ଚନ
କରନ୍ତୁ । ତା' ପରେ କୀଟ ଆକ୍ରମଣ ନ
କମିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିଲାକାର୍ ପ୍ରତି ୨ ଲିଟର
ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ଗୋଲାଇ
ପଡ଼ୁ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇପାରେ । ସକାଳ
ଗା ପରେ (କାକର ଶୁଖିଲା ପରେ)
କପା ତୋଳନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ ଥର ଏବଂ
ପ୍ରତିଥର ତୋଳା ଯାଉଥୁବା କପାକୁ
ଆଲଗା ରଖୁ ଶୁଖାଇ ସଫାକରି ଶୁଖିଲା

ଦ୍ୟାମ୍ଭକ ବହୁରେ ସାଇତ ରଖନ୍ତି ।
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ...
 ►ଫଳ ବରିବାକୁ ବର୍ଷାପରେ
 ଭଲଭାବରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ।
 ►ଫଳବରିବା ସାପାକରି ଅନୁମୋଦିତ
 ପ୍ରଶାଳୀରେ ଖତ, ରାସାୟନିକ ସାର ଓ
 ଅଣୁସାର ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଛରେ
 ଦିଆନ୍ତୁ ।
 ►ଆଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳସେଚନ
 କରନ୍ତୁ ।
 ►ପୁରୁଣା ଗଛକୁ କାଣ୍ଡଛାଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ
 ମାଆ ଗଛରୁ ବାହାରୁଥିବା କୁଆଁକୁ କାଟି
 ଦିଆନ୍ତୁ ।
 ►ଉଇ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧାନ
 ଦିଆନ୍ତୁ ।
 ►ଗଛ ମୂଳକୁ ଛାଦିକରଣ କରନ୍ତୁ ।
 ►ବର୍ଷାମାନ କଦମ୍ବ ଗଛ
 ଲଗାଇପାରିବେ । ଏଥପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମେନ,
 ପାଟକ୍କପୁରା, ଡି.ସି. ପ୍ରତୃତି କିସମ
 କୋଟିମିଳେ ।

ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ନୋଟ ବିତ୍ତନୀ

ନ ଗଛରେ ମାଟିଆ ଗୁଡ଼ିପୋକ ଫୋନିକାମିଡ଼ ୧୫୦ ଗ୍ରାମ ହେଲୁର ପ୍ରତି କିମ୍ବ ୧ ମି.ଲି.ଭାଇମୋଟେପ୍ୟୁରାନ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ହେଲୁର ପ୍ରତିକିମ୍ବ ପାଇମେଟ୍ରୋଜାଇନ୍୩୦୦ ଗ୍ରାମହେଲୁର ପ୍ରତିକିମ୍ବ ଗ୍ରାଇଷ୍ଟ୍ରୁମେଜେପାଇରିନ ୨୫୦ ମି.ଲି. ହେଲୁର ପ୍ରତି ସ୍ଵେ କରନ୍ତୁ । ଗଣ୍ଠିପୋକ ଲାଗିଥିଲେ ମାଳାଥୁଅନ ଗୁଣ୍ଠ ୨୦-୨୫ କି.ଗ୍ରା. ହେଲୁର ପ୍ରତି (ଭୋର ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଠ ଉଡ଼ାଇବା ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ) କିମ୍ବ କ୍ଲୋରପାଇରିପ୍ସ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ଦିଶାଇ ସ୍ଥାଯୀତ୍ବ ସମୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କେଣ୍ଟାକିଟା ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ କିଆରି ହିତ ଚାରିପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳା ସିଞ୍ଚନ କରିବା ସହିତ କ୍ଲୋରପାଇରିପ୍ସ ସ୍ଥାନ ୧ ମୁନ୍ତ ଓସାରେ ବିଶ୍ଵା ଏବଂ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମି.ଲି. କ୍ଲୋରପାଇରିପ୍ସ କିମ୍ବ ପ୍ରୋଫେନୋପ୍ସ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜମିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିଷଥୋପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ । ନେକ୍ରାଷ୍ଟ ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ହେଲ୍କାକୋନାଗୋଲ୍ ୧.୪ ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି / ଗ୍ରାଇଷ୍ଟ୍ରୁମେଜୋଲ୍ ୧.୪ ଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଲାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ର ଆଛାଦ ପୋଡ଼ାଗେର ଲାଗିଲେ ତାହାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଡାଲିଡ଼ମାଇସିନ ୩% ଏଲ୍ ୨ ମି.ଲି./ଲିଟର କିମ୍ବ ପ୍ରୋପିକୋନାଗୋଲ୍ ୨୫% ଲ୍ଯ.ସି.



