



DSPL - 404

**ଶ୍ରୀମିଳ ସ୍ନାନାନ୍ତରଣ ରୋକିବା ଓ
ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି
ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ
ଆଉ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ**

“କ୍ଷେତ୍ର ସପୋର୍ଟ ରୁ ମହାଯ୍ଵା ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା”
ଆଉ ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ଟି କୁକୁକୁ ସମ୍ପର୍କିତ

ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଓ କୁକ୍କା

ଜିଲ୍ଲା	ବୁଦ୍ଧ
ଗଜପତି	ମୋହନା, ନୂଆଗଡ଼
କଣ୍ଠମାଳ	ପିରିଣ୍ଣିଆ, ବାଲିଗୁଡ଼ା
କୋରାପୁଟ	ବୋରିଗୁନ୍ଧା, ଦଶମନ୍ତପୁର
ନବରଙ୍ଗପୁର	ଛରିଗଁ, ପାପତାହାଣ୍ତି
ରାୟଗଡ଼	କାଶୀପୁର, କଳ୍ପାଣୀହପୁର

୭ଲକ୍ଷ ଟଣ ହଜାର ୩୮୮ ପରିବାର ଓ ୩ ଲକ୍ଷ ୮୩ ହଜାର ୮୭୭ ଶ୍ରମିକ ହେବେ ଉପକୃତ

ମନରେଗା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ :

- ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଭାରିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଙ୍ଗୁରି ପ୍ରଦାନ
 - ୩୦୦ ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି
 - ପ୍ରଥମ ୧୦୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେନିକ ୧୧୪ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ମଙ୍ଗୁରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ
 - ଦେନିକ ୩୫୭ ଟଙ୍କା ହାରରେ ୨୦୦ ଦିନର ଅତିରିକ୍ତ ଶମ ଦିବସ ଯୋଗାଣ

ଗ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ର

ସାଧାରଣ ଭାବେ ନଦ୍ଦିଆ ତେଲ ବସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗହମ ବୁଶା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ । ଆଖ୍ୟତରାଣ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରିକ୍ଟରେ ବିଳମ୍ବରେ ଗହମ ବୁଶାଯାଇପାରିବ । ଗହମ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ଥତି କରନ୍ତୁ । ଅଧିକ ଅମଳକମ ଗହମ ବିହନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି - ଗୋନାଲିଙ୍କା, ପି.ବି.ଡ୍ରୁୟ-୧୪୩୪, ପି.ବି.ଡ୍ରୁୟ-୧୪୩୩, ମୂପି.-୨୭୭, ଏଟ୍ରି-୨୭୫୪ ଅବି ବିହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ । ହେବୁର ପ୍ରତି ୧୨୪ କି.ଗ୍ରା. ବିହନକୁ କାର୍ବେଣ୍ଟିମ୍ (କେ.କି. ପ୍ରତି ୨ ଗ୍ରାମ) ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷାଧିତ କରି ଧାତିକୁ ଧାତି ୨୦ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ୮୦:୪୦:୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଅନୁମୋଦିତ ସାରର ଅଧା ଯବକାରକାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିପରା ଓ ପରାସ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବୁଶନ୍ତୁ । ଏହି ଚାଷରେ ଘାସ ନିଯନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପେଣ୍ଟିମେଥାଲିନ୍ ହେବୁର ପିଣ୍ଡା ୧ କି.ଗ୍ରା. (ଏକ ହେବୁର ପାଇଁ ମାତ୍ରମାତ୍ର ମି.ଲି. ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ୩୦ ଇ.ସି.) ହିସାବରେ ୧-୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ପ୍ରମାଣିତ

ଗୋଲାପ ଫୁଲଗଛର ପୁରୁଣା ଡାଳସବୁ କାଟି ଦିଆନ୍ତିରୁ । କଟା ଅଗରେ ବୋର୍ଡୋପେଷ୍ଟ ଲଗାନ୍ତିରୁ । ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଛୁଟିଆ ଓ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଶିଥ ଦୂନକୁ ଏ ଲିଟର ପାଣିରେ ମଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲଗାନ୍ତି । ଗଛରେ ନୂଆପତ୍ର ବାହାରିଲେ ଗଛ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ଯବଶାରଜାନ, ୧୦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚପରିଷ ଓ ୧୫ ଗ୍ରାମ ପରାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି । ବର୍ଷା ଯୋରୁ ଗୋପୁଲୁ ଗଛ ଲଗାଇ ନ ଥିଲେ ବର୍ଷାମାନ ଲଗାନ୍ତି । ସିରାକୋଳ, ଆପ୍ରିକାନ ତତ୍ତ୍ଵ ଜୀବାଣୁ ଅରେଓ, ଆପ୍ରିକାନ ତତ୍ତ୍ଵ ଜ୍ୟାଣ୍ଟ ଯେଲୋ, ପୁଷ୍ଟା ବାସନ୍ତୀ ଆଦି ଉନ୍ନତ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଗ୍ଲାଡ଼ିଓଲି କନାରୁ ଓଡା ବାଲିରେ ଗଜା କରି ଲଗାନ୍ତି । କନା ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତି । ପ୍ରେଷ୍ଟେରିପ, ପ୍ରେଷ୍ଟେରିପ ଫ୍ଲାଇଟ, ପିଚର ପିଯାରିଷ, ରେତ ବିଚିତ୍ର, ନୋଟାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହରମାଙ୍ଗସ୍ତ୍ର, କ୍ଲାକ ଜ୍ୟାକ, ଚେକିଲ୍‌ସମ, ଅର୍ଜନା, କିଥିଆ, ଧନ୍ତରା, ଦର୍ଶନ ଆଦି ଉନ୍ନତ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଗ୍ଲାଡ଼ିଓଲି ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ।



ଗାନ୍ଧିଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ସମସ୍ୟା ଓ ପୁଣିକାର



ରହିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଥର ବାଲ୍ମୀରି
ଜନ୍ମ କରିବାର ବ୍ୟବଧାନ ୯୦-୧୦୦
ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗାଇ ଗର୍ଭଧାରଣ ନ
କରିଲେ ୪୦-୫୫ ଶତକତା ଆର୍ଥିକ
କ୍ଷତି ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ଗୋଠରେ ୫୫ ଶତକତାରୁ ଅଧିକ
ବାଲ୍ମୀମଙ୍କର ପ୍ରଜନନକିରି
ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଭୁଲ ପରିଚାଳନା ହୁଁ
ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ଏହାକୁ ପ୍ରାଣୀ
ଟିକିସିକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ହୁଁ ଠିକ୍
କରାଯାଇପାରିବ । ପ୍ରଜନନ କ୍ୟମତା
ହେଉ ୧୦୦୦ ଲୋକରେ କ୍ୟାମ୍ବାରୀ

9. ଶରାରରେ ମୁଖ୍ୟତ ସହ ଜତିତ ଥିବା ଅଙ୍ଗମଙ୍କୁ
କରିବା ରୋଗ : ଏହି ପ୍ରକାର
ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଜନନ ଉପରେ
ପକାଇଥାନ୍ତି । ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ
ଗ୍ରାଜକୋମୋନିଆସିୟ, ବ୍ରୂଷେଟେ
ଭିନ୍ନୀୟେସି ଲାଭ୍ୟାଦି । ଏହି ତେ
ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜନନ
ଅଙ୍ଗରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ହେବା
ସହ ଅଞ୍ଚିତମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା
ଗ୍ରାଜକୋମୋନିଆସିୟ
ମାଧ୍ୟମରେ । ଏହି

A photograph of a brown and white cow standing in a green pasture. The cow has large white patches on its brown coat and is wearing a white plastic collar with a yellow identification tag. In the background, there is a fence and a line of trees under a clear sky.



ମୁକୁନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବସିବାସ କରନ୍ତି
ଗାଣିମାନଙ୍କ ପରି ଶୁଲ୍କ ଶିଖିମାନଙ୍କଙ୍କ
କୌଣସି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶିର୍ଷ
ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି
ରୋଗ ଚିରବ୍ୟାୟୀ ହୋଇ ରହିଯାଏ
ଲକ୍ଷଣ : ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିତି
ହେଲା-ଗର୍ଭାଶୟରେ ପୂଜ ହେବା ଏବଂ
ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୂଜା ବାହାରକୁ ନିର୍ଗ୍ରହ
ହେବା, ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାରେ ଅସମାନ
ହେବା ଏବଂ ୧-୧୭ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ
ଗର୍ଭପାତ ହେବା । ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଶାଳୀଟେ
ପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ

ହେଉଥିବା ଲାକକୁ ଅଣୁବାକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର
ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରିଲେ, ଏହି ରୋଗ
ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ । ଏହି
ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୋଠରେ
ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଜନନ ବନ୍ଦ କରିବା ନିତାନ୍ତ
ଆବଶ୍ୟକ । କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରିବା
ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗରୁ ଫୁଲ୍ଲି ମିଳିଥାଏ ।
ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଗର୍ଭାଶୟ ଉତ୍ତରକୁ
ଲୁଗୋଲସ୍, ଆୟୋତ୍ତିନ୍/ସୋତ୍ତିଯମ
ପରବୋରେଟ୍/କ୍ଲୋରିନ୍/ଆକ୍ରମଣିତିନ୍
ପୂରାଇ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାଆନ୍ତି ।
ଭିକ୍ରିଯୋସିସ୍ : ଗାଇମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି
ରୋଗ ଯୌନ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ।
ଏହି ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭିକ୍ରିଓ
ପିରସ ଭେନେରିଆଲିସ୍ ଅଟେ । ପ୍ରଥମ
ଥର ଏହି ରୋଗକୁ ମ୍ୟାକ୍ରମାତ୍ରିଯାନ
ଏବଂ ସ୍କୁମାନ୍ ୧୯୧୦ ଏବଂ
୧୯୧୩ରେ ମୋର୍କା ଏବଂ ଗାଇଠାରେ
ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଣୁଜାବ ମଧ୍ୟ
ଗାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ସହ ଜଡ଼ିତ
ଅଞ୍ଜ, ଭୁଣି, ଲାହି ନାତ ଇତ୍ୟାଦିରେ
ବସବାସ କରିଥାଏ । ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଜନନର
ସ୍ଵର୍ଗ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଣୁଜାବ
ଗର୍ଭାଶୟ ଉତ୍ତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ।

- ▶ ଯୋନି ଦ୍ୱାରରୁ ଗରମ ସମୟରେ ଅଧିକ ଏବଂ ଅଳଗା ପ୍ରକାରର ଲାଳ ନିର୍ମିତ ହେବା ।
- ▶ ଗର୍ଭ ନ ରଖୁବା ଏବଂ ଛାଅ ମାସରୁ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧ୍ୟାଗୁଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ।
- ▶ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆନେକ ଥର ସଙ୍ଗମ କରିବା ।
- ▶ ତୁଳିଟି ରତ୍ନତକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ।
- ▶ ବିଳମ୍ବିତ ଗର୍ଭପାତ ହେଲେ ନାହିଁନାହିଁ ବାହାରକୁ ନ ଆସିବା ଏବଂ ନାହିଁନାହିଁ ଧୂସର ପଡ଼ିଯିବା । (କ୍ରମଶଳୀ..)
- ଓୟୁସନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ମାଛ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ମରାମତ

ମାଛ ପୋଖରୀ ଦୁଡ଼ାକାଙ୍ଗି ଯାଇଥୁଳେ
ଦୂରତ୍ତ ମରାମତି କରନ୍ତୁ । ଏକ ହେଙ୍କୁର
ବିଶିଷ୍ଟ ମାଛପୋଖରୀର ୧୯୪୦୦
ଜାର୍ଥିଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ୩ କି.ଗ୍ରା. ୭୫୦
ଗ୍ରାମ କଣ୍ଠିଆ କୁଣ୍ଡା ଓ ୩ କି.ଗ୍ରା. ୭୪୦
ଗ୍ରାମ ବାଦାମ ପିଣ୍ଡିଆ ମିଶାଇ ସମ୍ମାନ
ଦେଖିବାକୁ ୩ କି.ଗ୍ରା. ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ଦାନା
ଖାଇବାକୁ ଦିଆନ୍ତୁ । ପୋଖରାର ନିମ୍ନ
ସ୍ଥରରେ ଥିବା ମିରିକାଳି ଓ ବିଲାତି ରୋହି
ଉପରସ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଓ ପୋଖରୀ
ଜଳମାଟିରୁ ଦୂରତ୍ତ ବାହାରୁଥିଲେ ପ୍ରତି
ହେଙ୍କୁ ମିଚର ପାଣିରେ ୪୦ କି.ଗ୍ରା.
ଜିଓଲାଇର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଶାତଦିନ
ପ୍ରାରମ୍ଭ ପୋଖରାରେ ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଦୂନ
ସହିତ ୪ କି.ଗ୍ରା. ହଳଦାରୁଗୁଡ଼ ମିଶାଇ
ଦୁଇଟି କିମ୍ବରେ ୧ ମାସ ଅନ୍ତରରେ
ପକାଇଲେ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଲ
ନ ଥାଏ । ପକ୍ଷ ଓ ଲାଞ୍ଚ ପାଶ ରୋଗ
ହେଲେ ଲିଟର ପିଣ୍ଡା ୧.୫ ମି.ଗ୍ରା.
ଦୁଇଥାରୁ ଜଳର ମିଶାଇ ମାଛଙ୍କୁ ୨
ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ । ଆଖୁପଶ ରୋଗ
ହେଲେ ଲିଟର ପିଣ୍ଡା ୮ ରୁ ୧୦ ମି.ଗ୍ରା.
କୋରୋମାକୁ ସେଟିନ ଜଳର ଦବାଭତ

8

ମୁକ୍ତିଆଷ୍ଟ୍ରର ଯତ୍ନ

ଜମିରୁ ଶୁଖୁଳା ପଡ଼ି ବାହାରକରି
କେତ୍କୁ ପରିଷାର କରନ୍ତୁ । ଆଖୁ
ଶୁଖୁଳାକୁ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଚାଷକରି
ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଫଳରେ



କରଥାଏ । ମାର ଅଧିକ ଶୁଖୁଲାଇଥିଲେ
ଜଳସେଚନକରି ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ।
ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଲା ସମୟରେ ହେବୁର
ପ୍ରତି ୧୦ ଟନ ଗୋବରଖତ, ୧୦୦
କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା.
ଫେରସ୍ତାତିରେ ଓ ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ପଚାସ ସାର
ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଧାତି ମଧ୍ୟରେ ଗଛକୁ
ଗଛ ବ୍ୟବଧାନ ୪୫ ସେ.ମି.ରୁ ଅଧିକ
ଥିଲେ ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିବାର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ
ଶୁଷ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ଆଖୁ କାଟିବା
ବେଳେ ଆଖୁ ଖଣ୍ଡକୁ ଢଳ ପକାନ୍ତୁ କିମ୍ବା
ପଲିଥନ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାରା ଉତ୍ତାରେ
ମୁଣ୍ଡ ଆଖୁକୁ ରୋଗମୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଷ୍କ
କାଟିବା ପରେ ହେବୁର ପ୍ରତି ୭୦୦
ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଟାଙ୍ଗିମ ବା ଥାଯୋପାନେର୍
ମିଥାଇଲ୍ (୩୫୦ ଗ୍ରାମ) ୪୦୦ ଲିଟର

ପିଥାଜ କେମି ପ୍ରକୃତ



କି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏକ
ହେକ୍ଟାର ଜମିପାଇଁ ୫୦୦
ବର୍ଗମିଟର ପରିମିତ ଜମିରେ
ତଳି ପକାନ୍ତୁ । ତଳି ପଶାଳି
ମିଠାରୁ ଗଛ ଉଚ୍ଚ, ୧ ମିଟର ଓପାର
ବାବୁ ମୁଦ୍ରିବା ଅନୁଯାୟୀ ଲମ୍ବ ହେବା
ବାବଶ୍ୟକ । ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଭଲ ଶିଢ଼ା
ଖଲା ଗୋବର ଖତ ସହ ୧ କି.ଗ୍ରା.
ଶୁଙ୍କକୋଡ଼ମା ଭରିଦେ ଜାବାଶୂନ୍ୟାର
ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ୨-୩ ଦିନ
ପାଇରେ ପଳିଥିନ୍ଦ୍ର ଘୋଡ଼ାଇ ରଖି ତଳି
ପଶାଳିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଶେଷାଧିତ
ହମନ ଧାର୍ତ୍ତରେ ବୁଣ୍ଟି । ତଳିକୁ ଅବିନିଆ
ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାଁଶ କାଠି

ପ୍ରେମରେ ଜରି ଲଗାଇ ବର୍ଷାବେଳେ
ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ । ଜଳ ନିଷାଧାନ
ପାଇଁ ପ୍ରତି ତଳି ପଚାଳି ମଞ୍ଚିରେ ୧ ପୁଣ୍ଡ
ଓସାର ନାଳ ରଖନ୍ତୁ । ତଳି ୮-୧୦
ସପ୍ତାହ ହୋଇଥିଲେ ଜମିରେ ରୋପଣ
କରନ୍ତୁ । ହେବୁ ପିଛା ରୁ ୧୦ କି.ଗ୍ରା.
ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ । ଏତି ଫାଉଛୁ ଲାଇର
ରେଡ଼, ଏନ୍-୪୩, ଭାମା ସୁପର,
ଭୀମା ଶକ୍ତି ଆଦି ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ
ବିହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କରନ୍ତୁ । ହେବୁ ପିଛା
୧୨୦:୧୦:୨୦:୪୦ କି.ଗ୍ରା । ହିସାବରେ
ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫଂସରସ, ପଚାଶ ଓ
ସଲମର ସାରରୁ ହୁଇବି କିମ୍ବାରେ ପ୍ରୟୋଗ
କରନ୍ତୁ । ତଳି ରୋଇବା ବେଳେ ମୂଲସାର

ହିସାବରେ ଉଭୟ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏବଂ
ଫଂସରସ ସାରର ଅର୍ଜନ ଏବଂ
ସମ୍ବାଦ ପଚାଶ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ
। ନଭେମ୍ବର ମାସ ୨୦ ତାରିଖରୁ
ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁନ୍ଦା ପିଆଜ
ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରନ୍ତୁ ।
ଘାସମରା ଅନ୍ତର୍ଧାନ, ପେଣ୍ଟିମେଟାଲିନ୍
୩୦ ଏ.ଇ.କୁ ତଳି ରୋଇବାର ଦୁଇ ଦିନ
ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ହୋଇପାରିବ । ତଳି ରୋଇବାର ୧୪
ଦିନ ପରେ ନିମ୍ନ ସିଦ୍ଧ କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ ଏକକ୍ରାନ୍ତ
ଦ୍ରବଶବ୍ଦ ଲିଟର ପ୍ରତି ୪ ମି.ଲି. ହିସାବରେ
ଫଂସର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପତ୍ର ଉଚ୍ଛରଣ
(୨୫୫) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

00160 00160 000

କଣ୍ଠାବୀରଧାରା ଧରି
ଚିତ୍ରିତ ବକରା/ପାଟଳ ବକରା ପୋକ
ଲାଗିଲେ ୨.୫ ମି.ଲି. ଶ୍ରୀଅଜ୍ଞାପନସ୍ବା
୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଲାଇ ସିଞ୍ଚନ
କରନ୍ତୁ । ତା' ପରେ କୀଟ ଆକ୍ରମଣ ନ
କମିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିଲାକାର୍ ପ୍ରତି ୨ ଲିଟର
ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ଗୋଲାଇ
ପଡ଼ୁ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇପାରେ । ସକାଳ
ଗା ପରେ (କାକର ଶୁଖିଲା ପରେ)
କପା ତୋଳନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ ଥର ଏବଂ
ପ୍ରତିଥର ତୋଳା ଯାଉଥୁବା କପାକୁ
ଅଲଗା ରଖୁ ଶୁଖାଇ ସଫାକରି ଶୁଖିଲା

ଦ୍ୱାଷ୍ଟକ ବହୁରେ ସାଇତ ରଖନ୍ତି ।
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ...
➤ ଫଳ ବରିବାକୁ ବର୍ଷାପରେ
ଭଲଭାବରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ।
➤ ଫଳବରିବା ସାପାକରି ଅନୁମୋଦିତ
ପ୍ରଶାଳୀରେ ଖତ, ରାସାୟନିକ ସାର ଓ
ଅଣୁସାର ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଛରେ
ଦିଆନ୍ତୁ ।
➤ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳସେଚନ
କରନ୍ତୁ ।
➤ ପୁରୁଣା ଗଛକୁ କାଣ୍ଡଛାଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ
ମାଆ ଗଛରୁ ବାହାରୁଥିବା କୁଆଁକୁ କାଟି
ଦିଆନ୍ତୁ ।
➤ ଉଲ୍ଲ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧାନ
ଦିଆନ୍ତୁ ।
➤ ଗଛ ମୂଳକୁ ଛାଦିକରଣ କରନ୍ତୁ ।
➤ ବର୍ଷାମାନ କଦମ୍ବ ଗଛ
ଲଗାଇପାରିବେ । ଏଥପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମେନ,
ପାକିପୁରା, ଡି.ସି. ପ୍ରତୃତି କିସମ
ମୋଟାମିଳେ ।

မျှော်စွဲအကြောင်း နှေ့မှု ပို့ဆောင်ရေး

ନ ଗଛରେ ମାଟିଆ ଗୁଡ଼ିପୋକ ଫ୍ଲୋନିକାମିତ
୧୫୦ ଗ୍ରାମ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି କିମ୍ବା ୧
ମି.ଲି.ଡାଇନୋଟେପ୍ୟୁରାର ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ହେକ୍ଟର
ପ୍ରତିକିମ୍ବା ପାଇମେଟ୍ରୋଜାଇନ୍୩୦୦ ଗ୍ରାମ ହେକ୍ଟର
ପ୍ରତି କିମ୍ବା ଗ୍ରାଇପ୍ସ୍ଲୁମେଜୋପାଇରିନ୍ ୨୫୦ ମି.ଲି. ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି
ସ୍ଥେ କରନ୍ତୁ । ଗନ୍ଧିପୋକ ଲାଗିଥିଲେ ମାଳାଥିଅନ ଗୁଡ଼ ୨୦-
୨୫ କି.ଗ୍ର. । ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି (ଭୋର ସମୟରେ ଗୁଡ଼ ଉଡ଼ାଇବା
ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ) କିମ୍ବା କ୍ଲୋରପାଇରିପ୍ସ ପ୍ରତି
ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ହିଥାବରେ ଦିଶାଇ ସ୍କୁର୍‌ସ୍କୁର୍
ସମୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କେଣ୍ଠାକଣ ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ

କିଆରି ହିତ ଚାରିପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳା ସିଞ୍ଚନ କରିବା ସହିତ
କ୍ଲୋରପାଇରିପ୍ସ ଗୁଡ଼ ୧ ପ୍ଲୁଟ ଓୟାରେ ବିଶ୍ଵା ଏବଂ ଏକର
ପ୍ରତି ୪୦୦ ମି.ଲି. କ୍ଲୋରପାଇରିପ୍ସ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫେନୋପ୍ସ
ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜମିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିଷଥୋପ
ପ୍ରଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ । ନେକ୍ସାଷ୍ଟ ପୋକ ଦମନ
ପାଇ ହେଲ୍ପାକୋନାଜୋଲ୍ ୧.୪ ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି/
ଗ୍ରାଇଜାଇକ୍ଲାଜୋଲ୍ ୧.୪ ଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ
ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ର ଆହ୍ଵାଦ ପୋଡ଼ାଗୋର ଲାଗିଲେ
ତାହାରୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଭାଲିଡ଼ିମାଇସିନ୍ ୩% ଏଲ୍
୨ ମି.ଲି. /ଲିଟର କିମ୍ବା ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ ୨୫% ଲ୍ଯ.ସି.



