





5



ଓଡ଼ିଶା ସରକାର



DSPL - 404



ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୋକିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ

“କ୍ଷେତ୍ର ସପୋର୍ଟ ରୁ ମହାମ୍ବା ଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା”
ଆଉ ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ଟି କ୍ଲକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କିତ

ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଓ କ୍ଲକ୍:

ଜିଲ୍ଲା

ଗଜପତି

କଷମାଳ

କୋରାପୁର

ନବରଙ୍ଗପୁର

ରାୟଗଡ଼

କ୍ଲକ୍

ମୋହନା, ନୂଆଗଡ଼

ପିରିଙ୍ଗିଆ, ବାଲିଗୁଡ଼ା

ବୋରିଗୁଣ୍ଡା, ଦଶମନ୍ତପୁର

ଝରିଗ୍ନୀ, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି

କାଶୀପୁର, କଲ୍ୟାଣର୍ଧିହପୁର

୭ଲକ୍ଷ ଟଣ ହୁଜାର ଟାର୍ଟ ପରିବାର ଓ ୩ ଲକ୍ଷ ଟଣ ହୁଜାର ଟାର୍ଟ ଶ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଉପକୃତ

ମନରେଗା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ :

- ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଭାରିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରି ପ୍ରଦାନ
- ୩୦୦ ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି
- ପ୍ରଥମ ୧୦୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଇନିକ ୧୧୪ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ମଜୁରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ
- ଦେଇନିକ ୩୫୨ ଟଙ୍କା ହାରରେ ୨୦୦ ଦିନର ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗାଣ

દેખાયુદ્ધ

(ક્રમે લોકપૂજાનું જે જનમાનની વિષ્ણુ હેઠળથી જગતાલ્લુ

પાટીકા-પાઠકા નિકટરે પણ આજીવા એકાશે ધરીત્રીની પ્રયોગા)

ચેત્તુલુ;

પૂરુષ કથાનું મને હેલે;

પાયોએ ગલાલાની કુણ્ણા બોધે;

કુણ્ણા બિક્કા હેલા ચાતર;

માથા બિદ્ધાનાની કુણ્ણા ટોકેલ,

બાપ બિદ્ધાનાની પદવા।

વિદ્ધુ નિજ અંતાનું ભૂલું ન યિદ્ધા ઉત્તિ। વાધારણની વિદ્ધુ રથથી જગતાલ્લુ મને સ્વલ્પ હોલે ઉઠે, વેચેબેને એ તા' અંતાને મુખદ મુખું જીવું જીવું હોલે રહેલું હેઠળાનાર ધન ગર્વને મનુષ્યાલા હોલે અંહાર કરીબબેને। તેચેબેનું દાર્ઢાદિયાં વિદ્ધુ વિદ્ધુ કરીની અનુભૂતિ, તુંનું જીવા એ સ્વચ્છાની અનીવા ઉત્તિ બેની એઠારે બસ્તુના કરાયાલું।

ગોહર દેખે!

મોર દેખેલા ડાહાન આખી।

અન્યાર ભલ વેશુલું કેચે લોકાની મન હાંઘાયારું હોલેયાએ। એપર બાંધુ અન્યાર સુખ શીખાનું આગે એહું કરીપારી ન થિયું કિ બરદાસ્ત બા ગ્રસ્થ કરી પારન આ'ંદી અન્યાર ઉત્તિ દેખે લોકાની હેઠળાના જીવાપારાયાન વિદ્ધુ પ્રિએ એકાની ઉંચું પ્રુણાન કરાયાલું। નિર્બિંદુ જગતાલ્લુ, પ્રબન્ન પ્રબન્ન તે અન્યાન્ય - પ્રાગ વાહિયું પ્રતિશ્વાન



સહેદારે મારી આજાનું

હાજુ નબા ટિક નુંહેં

© Dharitri

દ્વાયક મોકિમંજુ પણ રૂપું ઉપસ્થાપન અસ્પૃષ્ટ

કંચન, ૧૧૧૧ (કાર્યક સાહુ)

બારબાટા-કંચન નિર્બાચની

માનલારે બધાયક મનુષ્યનું

મોકિમંજુ પણ રૂપું જાતીય બિલું

દિન મુશ્કું ઉપસ્થાપન કરાયાલું

બિલું નિર્બાચની નિર્બાચની

નિર્બ

ଗ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ର

ସାଧାରଣ ଭାବେ ନଦ୍ଦିଆ ତେଲ ବସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗହମ ବୁଶା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ । ଆଖ୍ୟତରାଣ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରିକ୍ଟରେ ବିଳମ୍ବରେ ଗହମ ବୁଶାଯାଇପାରିବ । ଗହମ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ଥତି କରନ୍ତୁ । ଅଧିକ ଅମଳକମ ଗହମ ବିହନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି - ଗୋନାଲିଙ୍କା, ପି.ବି.ଡ୍ରୁୟ-୧୪୩୪, ପି.ବି.ଡ୍ରୁୟ-୧୪୩୩, ମୂପି.-୨୭୭, ଏଟ୍ରି-୨୭୫୪ ଅବି ବିହନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ । ହେବୁର ପ୍ରତି ୧୨୪ କି.ଗ୍ରା. ବିହନକୁ କାର୍ବେଣ୍ଟିମ୍ (କେ.କି. ପ୍ରତି ୨ ଗ୍ରାମ) ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷାଧିତ କରି ଧାତିକୁ ଧାତି ୨୦ ସେ.ମୀ. ବ୍ୟବଧାନରେ ୮୦:୪୦:୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଅନୁମୋଦିତ ସାରର ଅଧା ଯବକାରକାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିପରା ଓ ପରାସ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବୁଶନ୍ତୁ । ଏହି ଚାଷରେ ଘାସ ନିଯନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପେଣ୍ଟିମେଥାଲିନ୍ ହେବୁର ପିଣ୍ଡା ୧ କି.ଗ୍ରା. (ଏକ ହେବୁର ପାଇଁ ମାତ୍ରମୁଠ ମି.ଲି. ଷ୍ଟର୍ପ୍ ୩୦ ଇ.ସି.) ହିସାବରେ ୧-୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ପ୍ରମାଣିତ

ଗୋଲାପ ଫୁଲଗଛର ପୁରୁଣା ଡାଳସବୁ କାଟି ଦିଆନ୍ତିରୁ । କଟା ଅଗରେ ବୋର୍ଡୋପେଷ୍ଟ ଲଗାନ୍ତିରୁ । ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଛୁଟିଆ ଓ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ଶିଥ ଦୂନକୁ ଏ ଲିଟର ପାଣିରେ ମଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲଗାନ୍ତି । ଗଛରେ ନୂଆପତ୍ର ବାହାରିଲେ ଗଛ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ଯବଶାରଜାନ, ୧୦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚପରିଷ ଓ ୧୫ ଗ୍ରାମ ପରାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି । ବର୍ଷା ଯୋରୁ ଗୋପୁଲୁ ଗଛ ଲଗାଇ ନ ଥିଲେ ବର୍ଷାମାନ ଲଗାନ୍ତି । ସିରାକୋଳ, ଆପ୍ରିକାନ ତତ୍ତ୍ଵ ଜୀବାଣୁ ଅରେଓ, ଆପ୍ରିକାନ ତତ୍ତ୍ଵ ଜ୍ୟାଣ୍ଟ ଯେଲୋ, ପୁଷ୍ଟା ବାସନ୍ତୀ ଆଦି ଉନ୍ନତ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଗ୍ଲାଡ଼ିଓଲି କନାରୁ ଓଡା ବାଲିରେ ଗଜା କରି ଲଗାନ୍ତି । କନା ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତି । ପ୍ରେଷ୍ଟେରିପ, ପ୍ରେଷ୍ଟେରିପ ଫ୍ଲାଇଟ, ପିଚର ପିଯାରିଷ, ରେତ ବିଚିତ୍ର, ନୋଟାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହରମାଙ୍ଗସ୍ତ୍ର, କ୍ଲାକ ଜ୍ୟାକ, ଚେକିଲ୍‌ସମ, ଅର୍ଜନା, କିନ୍ତିଆ, ଧନ୍ତରା, ଦର୍ଶନ ଆଦି ଉନ୍ନତ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଗ୍ଲାଡ଼ିଓଲି ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ।



ଗାନ୍ଧିଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ସମସ୍ୟା ଓ ପୁଣିକାର



ରହିଥାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଥର ବାଲ୍ମୀରି
ଜନ୍ମ କରିବାର ବ୍ୟବଧାନ ୯୦-୧୦୦
ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗାଇ ଗର୍ଭଧାରଣ ନ
କରିଲେ ୪୦-୫୫ ଶତକତା ଆର୍ଥିକ
କ୍ଷତି ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ଗୋଠରେ ୫୫ ଶତକତାରୁ ଅଧିକ
ଗାଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନକିମ୍ବ
ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଭୁଲ ପରିଚାଳନା ହଁ
ଏକମାତ୍ର ମୂଣ୍ଡ କାରଣ । ଏହାକୁ ପ୍ରାଣୀ
ଟିକିସିକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ହଁ ଠିକ୍
କରାଯାଇପାରିବ । ପ୍ରଜନନ କ୍ୟମତା
ହଁ ୧୦୦୦୦ ପ୍ରାଣୀରେ ଏହି

9. ଶରାରରେ ମୁଖ୍ୟତ ସହ ଜତିତ ଥିବା ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ
କରିବା ରୋଗ : ଏହି ପ୍ରକାର
ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଜନନ ଉପରେ
ପକାଇଥାନ୍ତି । ଉଦା
ଗ୍ରାଜକୋମୋନିଆସିୟ, ବ୍ରୁଷ୍ଟେ
ଭିନ୍ନୀୟେସି ଲାଭ୍ୟଦି । ଏହି ତେ
ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜନନ
ଅଙ୍ଗରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ହଁ
ହେବା ସହ ଅଞ୍ଚିତମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା
ଗ୍ରାଜକୋମୋନିଆସିୟ
ମାଧ୍ୟମରେ । ଏହି

A photograph of a brown and white cow standing in a green pasture. The cow has large white patches on its brown coat and is wearing a white plastic collar with a yellow identification tag. In the background, there is a fence and a line of trees under a clear sky.



ମୁକ୍ତନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବସିବାସ କରନ୍ତି
କ୍ରାନ୍ତି ଗାନ୍ଧିମାନଙ୍କ ପରି ଶୁଳ୍କ ଶିଖମାନଙ୍କଙ୍କ
ରାଗ କୌଣସି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶିର୍ଷ
ଆବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି
ରାଗ ଚିରଜ୍ଞାୟୀ ହୋଇ ରହିଯାଏ
ରାଗ-
ଅନ୍ତରେ ଲକ୍ଷଣ : ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିତିର
ନିର୍ଦ୍ଦିତ ହେଲା-ଗର୍ଭାଶୟରେ ପୂଜ ହେବା ଏବଂ
ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୂଜା ବାହାରକୁ ନିର୍ଗ୍ରହ
ମୁକ୍ତି ହେବା, ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାରେ ଅସମାନ
ଏଥାଏ ।
ହେବା ଏବଂ ୧-୧୭ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ
ଗର୍ଭପାତ ହେବା । ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଶାଳୀଟିକେ
ପାଇଁ ଦେଇବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମକୁ ପାଇଁ

ହେଉଥିବା ଲାଳକୁ ଅଣୁଗୀକଶ ଯନ୍ତ୍ର
ଦ୍ୱାରା ପରିକ୍ଷା କରିଲେ, ଏହି ରୋଗ
ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ । ଏହି
ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୋଠରେ
ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଜନନ ବଦ କରିବା ନିତାନ୍ତ
ଆବଶ୍ୟକ । କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରିବା
ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗରୁ ମୁଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ ।
ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଗରାଶୟ ଭିତରକୁ
ଲୁଗୋଲସ୍, ଆୟୋତିନ୍/ସୋତିଯମ
ପରବୋରେଟ୍/କୋରିନ୍/ଆକ୍ରିଫ୍ଲୁଭିନ୍
ପୂରାଇ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାଆନ୍ତି ।
ଭିକ୍ରିଯୋସିସ୍ : ଗାଇମାନଙ୍କଠାରେ ଏହି
ରୋଗ ଯୌନ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ।
ଏହି ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଭିକ୍ରିଓ
ପିରସ ଭେନେରିଆଲିସ୍ ଅଟେ । ପ୍ରଥମ
ଥର ଏହି ରୋଗକୁ ମ୍ୟାକିପାଡ଼ିଯାନ
ଏବଂ ସ୍କୁଟାମାନ୍ ୧୯୧୦ ଏବଂ
୧୯୧୩ରେ ମେଘ୍ୟ ଏବଂ ଗାଇଠାରେ
ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଣୁଜୀବ ମଧ୍ୟ
ଗାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ସହ ଜିତି
ଅଙ୍ଗ, ଭୂଶା, ଲାହି ନାତ ଲତ୍ୟାଦିରେ
ବସବାସ କରିଥାଏ । ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଜନନର
ସ୍ଵର୍ଗ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଣୁଜୀବ
ଗର୍ଭାଶୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ।

- ▶ ଯୋନି ଦ୍ୱାରରୁ ଗରମ ସମୟରେ
ଅଧିକ ଏବଂ ଅଳଗା ପ୍ରକାରର ଲାଳ
ନିର୍ମିତ ହେବା ।
- ▶ ଗର୍ଭ ନ ରଖୁବା ଏବଂ ଛାଇ ମାସରୁ
ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧ୍ୟାଗୁଣ ପରିଲକ୍ଷିତ
ହେବା ।
- ▶ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର
ସଜ୍ଜା କରିବା ।
- ▶ ଦୁଇଟି ରତ୍ନକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବ୍ଧାନ
ବୃଦ୍ଧି ହେବା ।
- ▶ ବିଳମ୍ବିତ ଗର୍ଭପାତ ହେଲେ ନାହିନାତ୍ର
ବାହାରକୁ ନ ଆସିବା ଏବଂ ନାହିନାତ୍ର
ଧୂସର ପଡ଼ିବା । (କ୍ରମଶାସ୍ତ୍ରର
-ଓର୍ମୁଏଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ମାଛ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ମରାମତ

ମାଛ ପୋଖରୀ ଦୁଡ଼ାକାଙ୍ଗି ଯାଇଥୁଳେ
ଦୂରତ୍ତ ମରାମତି କରନ୍ତୁ । ଏକ ହେଙ୍କୁର
ବିଶିଷ୍ଟ ମାଛପୋଖରୀର ୧୯୪୦୦
ଜାର୍ଥିଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ୩ କି.ଗ୍ରା. ୭୫୦
ଗ୍ରାମ କଣ୍ଠିଆ କୁଣ୍ଡା ଓ ୩ କି.ଗ୍ରା. ୭୪୦
ଗ୍ରାମ ବାଦାମ ପିଣ୍ଡିଆ ମିଶାଇ ସମ୍ମାନ
ଦେଖିବାକୁ ୩ କି.ଗ୍ରା. ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ଦାନା
ଖାଇବାକୁ ଦିଆନ୍ତୁ । ପୋଖରାର ନିମ୍ନ
ସ୍ଥରରେ ଥିବା ମିରିକାଳି ଓ ବିଲାତି ରୋହି
ଉପରସ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଓ ପୋଖରୀ
ଜଳମାଟିରୁ ଦୂରତ୍ତ ବାହାରୁଥିଲେ ପ୍ରତି
ହେଙ୍କୁ ମିଚର ପାଣିରେ ୪୦ କି.ଗ୍ରା.
ଜିଓଲାଇର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଶାତଦିନ
ପ୍ରାରମ୍ଭ ପୋଖରାରେ ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଦୂନ
ସହିତ ୪ କି.ଗ୍ରା. ହଳଦାରୁଗୁଡ଼ ମିଶାଇ
ଦୁଇଟି କିମ୍ବରେ ୧ ମାସ ଅନ୍ତରରେ
ପକାଇଲେ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଲ
ନ ଥାଏ । ପକ୍ଷ ଓ ଲାଞ୍ଚ ପାଶ ରୋଗ
ହେଲେ ଲିଟର ପିଣ୍ଡା ୧.୫ ମି.ଗ୍ରା.
ଦୁଇଥାରୁ ଜଳର ମିଶାଇ ମାଛଙ୍କୁ ୨
ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ । ଆଖୁପଶ ରୋଗ
ହେଲେ ଲିଟର ପିଣ୍ଡା ୮ ରୁ ୧୦ ମି.ଗ୍ରା.
କୋରୋମାକୁ ସେଟିନ ଜଳର ଦବାଭତ

8

ମୁକ୍ତିଆଶ୍ରର ଯତ୍ନ

ଜମିରୁ ଶୁଖୁଳା ପଡ଼ି ବାହାରକରି
କେତ୍କୁ ପରିଷାର କରନ୍ତୁ । ଆଖୁ
ଶୁଖୁଳାକୁ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଚାଷକରି
ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତୁ । ଏହା ଫଳରେ



କରଥାଏ । ମାର ଅଧିକ ଶୁଖୁଲାଇଥିଲେ
ଜଳସେଚନକରି ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଛି ।
ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଲା ସମୟରେ ହେବୁର
ପ୍ରତି ୧୦ ଟନ ଗୋବରଖତ, ୧୦୦
କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା.
ଫେଫାରସ ଓ ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ପଚାସ ସାର
ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଧାତି ମଧ୍ୟରେ ଗଛକୁ
ଗଛ ବ୍ୟବଧାନ ୪୫ ସେ.ମି.ରୁ ଅଧିକ
ଥିଲେ ହୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିବାର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ
ଖୁଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ଆଖୁ କାଟିବା
ବେଳେ ଆଖୁ ଖଣ୍ଡକୁ ଢଳ ପକାନ୍ତୁ କିମ୍ବା
ପଲିଥନ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାରା ଉତ୍ତାରେ
ମୁଣ୍ଡା ଆଖୁକୁ ରୋଗମୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଖୁଣ୍ଡା
କାଟିବା ପରେ ହେବୁର ପ୍ରତି ୭୦୦
ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଟାଙ୍ଗିମ ବା ଥାଯୋପାନେର୍
ମିଥାଇଲ୍ (୩୫୦ ଗ୍ରାମ) ୪୦୦ ଲିଟର

ପାଞ୍ଜାବ

ଗୋଟିଏ

ପ୍ରକଟିକ୍



କି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏକ
ହେକ୍ଟାର ଜମିପାଇଁ ୫୦୦
ବର୍ଗମିଟର ପରିମିତ ଜମିରେ
ତଳି ପକାନ୍ତୁ । ତଳି ପଚାଳି
ମିଠାରୁ ଗଛ ଉଚ୍ଚ, ୧ ମିଟର ଓପାର
ବାବୁ ମୁଦ୍ରିବା ଅନୁଯାୟୀ ଲମ୍ବ ହେବା
ବାବଶ୍ୟକ । ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଭଲ ଶିଢ଼ା
ଖଲା ଗୋବର ଖତ ସହ ୧ କି.ଗ୍ରା.
ଶୁଙ୍କକୋଡ଼ମା ଭରିଦେ ଜାବାଶୂନ୍ୟାର
ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ୨-୩ ଦିନ
ପାଇରେ ପଳିଥିନ୍ଦ୍ର ଘୋଡ଼ାଇ ରଖି ତଳି
ପଚାଳିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଶେଷାଧିତ
ହମନ ଧାର୍ତ୍ତରେ ବୁଣ୍ଟି । ତଳିକୁ ଅବିନିଆ
ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାଁଶ କାଠି

ପ୍ରେମରେ ଜରି ଲଗାଇ ବର୍ଷାବେଳେ
ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ । ଜଳ ନିଷାଧାନ
ପାଇଁ ପ୍ରତି ତଳି ପଚାଳି ମଞ୍ଚିରେ ୧ ପୁଣ୍ଡ
ଓସାର ନାଳ ରଖନ୍ତୁ । ତଳି ୮-୧୦
ସପ୍ତାହ ହୋଇଥିଲେ ଜମିରେ ରୋପଣ
କରନ୍ତୁ । ହେବୁ ପିଛା ରୁ ୧୦ କି.ଗ୍ରା.
ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ । ଏତି ଫାଉଛୁ ଲାଇର
ରେଡ଼, ଏନ୍-୫୩, ଭାମା ସୁପର,
ଭୀମା ଶକ୍ତି ଆଦି ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ
ବିହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କରନ୍ତୁ । ହେବୁ ପିଛା
୧୨୦:୧୦:୨୦:୪୦ କି.ଗ୍ରା । ହିସାବରେ
ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫଂସରସ, ପଚାଶ ଓ
ସଲମର ସାରରୁ ହୁଇବି କିମ୍ବାରେ ପ୍ରୟୋଗ
କରନ୍ତୁ । ତଳି ରୋଇବା ବେଳେ ମୂଲସାର

ହିସାବରେ ଉଭୟ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏବଂ
ଫଂସରସ ସାରର ଅର୍ଜନ ଏବଂ
ସମ୍ବାଦ ପଚାଶ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ
। ନଭେମ୍ବର ମାସ ୨୦ ତାରିଖରୁ
ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁନ୍ଦା ପିଆଜ
ଲଗାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରନ୍ତୁ ।
ଘାସମରା ଅଷ୍ଟଧ, ପେଣ୍ଟମୋଟାଲିନ୍
୩୦ ଏ.ଇ.କ୍ରୁ ତଳି ରୋଇବାର ଦୁଇ ଦିନ
ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ହୋଇପାରିବ । ତଳି ରୋଇବାର ୧୪
ଦିନ ପରେ ନିମ୍ନ ସିଦ୍ଧ କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ ଏକଗ୍ରାଙ୍କ
ଦ୍ରବଣକୁ ଲିଟର ପ୍ରତି ୪ ମି.ଲି. ହିସାବରେ
ଫଂସର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପତ୍ର ଉଚ୍ଚଣ୍ଠା
(ଥ୍ରୀସ୍) ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଭାବୀର ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ମମ

ତିତ୍ରିତ ବକରା/ପାଟଳ ବକରା ପୋକ
ଲାଗିଲେ ୨୯.୫ ମି.ଲି. ଶ୍ରୀଆଜ୍ଞୋପସ୍ଥ
୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ସିଞ୍ଚନ
କରନ୍ତୁ । ତା' ପରେ କାଟ ଆକ୍ରମଣ ନ
କମିଲେ ଇନତ୍ତଙ୍କାର୍ବ ପ୍ରତି ୨ ଲିଟର
ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ଗୋଳାଇ
ପଡ଼ୁ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇପାରେ । ସକାଳ
ଟଙ୍ଗ ପରେ (କାକର ଶୁଖିଲା ପରେ)
କପା ତୋଳନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ ଥର ଏବଂ
ପ୍ରତିଥର ଗୋଳ ଯାଉଥିବା କପାକୁ
ଅଳଗା ରଖି ଶୁଖାଇ ସଫାକରି ଶୁଖିଲା

ଦ୍ୱାଷ୍ଟକ ବସ୍ତାରେ ସାଇତ ରଖନ୍ତୁ ।
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ...

➤ ଫଳ ବରିଗାକୁ ବର୍ଷାପରେ
ଭଲଭାବରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ।

➤ ଫଳବରିଗା ସମାଜର ଅନୁମୋଦିତ
ପ୍ରଶାଳୀରେ ଖତ, ରାସାୟନିକ ସାର ଓ
ଅଣୁସାର ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଛରେ
ଦିଆନ୍ତୁ ।

➤ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳସେଚନ
କରନ୍ତୁ ।

➤ ପୁରୁଣା ଗଛକୁ କାଣ୍ଡଛାଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ
ମାଆ ଗଛରୁ ବାହାରୁଥିବା କୁଆଁନ୍ତୁ କାଟି
ଦିଆନ୍ତୁ ।

➤ ଉଲ୍ଲ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧାନ
ଦିଆନ୍ତୁ ।

➤ ଗଛ ମୂଳକୁ ଛାଦିକରଣ କରନ୍ତୁ ।

➤ ବର୍ଷାମାନ କଦମ୍ବୀ ଗଛ
ଲଗାଇପାରିବେ । ଏଥୁପାଇଁ ଗ୍ରାସ୍ ନୈନ୍,
ପାଟକପୁରା, ଡି.ସି. ପ୍ରଭୃତି କିମ୍ବା
କୋଟିମିଳେ ।

ଖୁବ ଦୂରରେ ଯୋଗ ଦିଲ୍ଲି

ନ ଗଛରେ ମାଟିଆ ଗୁଡ଼ିପୋକ ଫେନିକାମିତ
୧୪୦ ଗ୍ରାମ ହେବୁର ପ୍ରତି କିମ୍ବା ୧
ମି.ଲି.ଭାଇମୋଟେପ୍ଯୁରାନ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ହେବୁର
ପ୍ରତିକିମ୍ବା ପାଇମେଟ୍ରୋଜାଇନ୍୩୦୦ ଗ୍ରାମହେବୁର
ପ୍ରତି କିମ୍ବା ଗ୍ରାଙ୍କ୍ଷୁମେଜୋପାଇରିନ ୨୪୦ ମି.ଲି. ହେବୁର ପ୍ରତି
ସ୍ଥେ କରନ୍ତୁ । ଗଞ୍ଜିପୋକ ଲାଗିଥିଲେ ମାଳାଥିଅନ ଗୁଡ଼ ୨୦-
୨୪ କି.ଗ୍ରା. ହେବୁର ପ୍ରତି (ଭୋର ସମୟରେ ଗୁଡ଼ ଉଡ଼ାଇବା
ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ) କିମ୍ବା କ୍ଲୋରପାଇରିପ୍ଥ ପ୍ରତି
ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମି.ଲି. ହିଂସାବରେ ଦିଶାଇ ସ୍ଥାନୀୟ
ସମୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । କେଣ୍ଠାକଣ ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ

କିଆରି ହିତ ଚାରିପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେନା ସିଞ୍ଚନ କରିବା ସହିତ
କ୍ଲୋରପାଇରିପ୍ଥ ଗୁଡ଼ ୧ ଘୂମ ଓସାରେ ବିଶ୍ଵା ଏବଂ ଏକର
ପ୍ରତି ୪୦୦ ମି.ଲି. କ୍ଲୋରପାଇରିପ୍ଥ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫେନୋପ୍ଥ
ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜମିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିଷଥୋପ
ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ । ନେକ୍କାଷ୍ଟ ପୋକ ଦମନ
ପାଇ ହେବୁକୋନାଗୋଲ୍ ୧.୪ ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି/
ଗ୍ରାଇଯାଇକ୍ଲାଜୋଲ୍ ୧.୪ ଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଲାଇ
ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ର ଆଛାଦ ପୋଡ଼ାଗୋର ଲାଗିଲେ
ତାହାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଭାଲିଡ଼ିମାଇସିନ ୩% ଏଲ୍
୨ ମି.ଲି./ଲିଟର କିମ୍ବା ପ୍ରୋପିକୋନାଗୋଲ୍ ୨୫% ଲ୍ଯ.ସି.



