



ଡ. ପରେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡିତ

“ତାଳି ଫୁଲର ଦେଗରେ ରାଇକେବିଯୁମ ବାଜାଣୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନକରି ଫୁଲ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଉତ୍ସବକୁ ଯୋଗାର୍ଥାଏ ଏହି ଫୁଲ (ମୁଗ, ହରତ୍ତ ଆଦି)ର ଦେର ମାଟିର ଗଭାର ପୁରକୁ ଯାରଥୁବାରୁ ଜମିରେ ଖାଦ୍ୟସାର ସନ୍ତୁଳନତା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ମାଟି ଫୁଲପରିସା ରହି ଅଧିକ ଜଳ ଧାରଣ କରିପାରିଥାଏ ଏକର ପ୍ରତି ବିବନ୍ଧିତ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ପରିମାଣ ୧୧-୮୦ କି.ଗ୍ରା. ଏବଂ ମିଶ୍ରଥୁବା କେବିକ ପଦାର୍ଥ (୨-୭ କୁଳଫାଲ) ଜମିରେ ଅନାବନା ଘାସର ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ସହ ଅତି ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରାଣ ଚାରା ଯୋଗାର୍ଥାଏ ତାଳି ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ମୁଗ, ବିରି, ମସ୍ତୁର ଆଦି ଚାଷକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରେସାହନ ଓ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହିସବୁ ଫୁଲ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିବାର ସହଜରେ ଯେକୋଣସି ଫୁଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।”

ପୁଣ୍ଡିକର ତୌରେ ଚାଷ



ବିହୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାନ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ।
କୃଷକ ପରିବାର ଆୟ ତଥା ପୋଷକ
ନିରାପଦାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି କୃଷକମାନଙ୍କର
ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ ଭାବେ

ଓ ডালি আম রাজ্যের মুখ্য খাদ্য। ডালি
পুষ্টিস্বার, আমিনো এবিত, ভিটামিন 'বি'
এবং ভিটামিন 'বি'র পুরণ উৎস। ডালির
গুরুত্বকু অনুভবকরি তাহাকু 'গরিব
লোকের পুষ্টিস্বার' কৃহায়াৎ। প্রাপ্ত
বয়স্ক মনুষ্য দেশিক প্রাপ্ত ৭০-৮০
গ্রাম ডালি খাইবা আবশ্যিক।

ଭାଲି ପଥଲର ଚେରରେ
ରାଜକୋବିଦ୍ୟମ ବାଜାଣୁ ଆଶ୍ରମ ନେଇ
ଯବନ୍ଧାରଜାନ ବିବନ୍ଧନକରି ପଥଲ ଓ

ଗୁହାଳ ତଳ ଓଦା ରଖନ୍ତି
ନାହିଁ । ଓଦା ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ
ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ।
ଗୁହାଳ ତଳକୁ ଶୁଣୁଳା ରଖିବା

ଜାଣି
ରଖନ୍ତୁ

ମହିଷି ଓ ବାହୁରାଙ୍ଗୁ ସାହାଶ ଓ ବଜ୍ରବଜ୍ଜିଆ ରୋଗ
ହେବା ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ଏହି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ନା
ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶେଧକ ଟିକା ଦିଅନ୍ତି । ରୋଗ
ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଟିକିଥିବାକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ନିଆନ୍ତି ।

➤ଗୋ-ମହିଷିଙ୍କ ଅନ୍ତେକୁ ଦିଇଅଛି । ଜୀବ ହେବାକୁ

- ଜୀବ ପରିବାରରୁ ଅନ୍ତରେ କାହାରେ କୁଟୁମ୍ବ ଦେଖାନଙ୍କ ଦେହରେ ଅଧିକ ତାତି ରହେ ଓ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ରେକି ରଖେ । ଏହି ବ୍ରାହ୍ମମନ୍ଦିରରେ ଉପଶମ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ଖୁଲ୍ଲାହୁ ।
- ଗୁରୁକାଳ ସବୁବେଳେ ପରିଷାର ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ରଖାନ୍ତିରେ ପରିବାରରୁ ଅଧିକ ତାତି ରହେ ଓ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ରେକି ରଖେ । ଏହି ବ୍ରାହ୍ମମନ୍ଦିରରେ ଉପଶମ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ଖୁଲ୍ଲାହୁ ।

ଏହାର ଗାରିପାଖ ଉଚ୍ଚା ଓ ନିରିଦ୍ଧା କରିଛୁ ନମେତା
ପାଣି ଜମି ସନ୍ତସଙ୍ଗିଆ ହେଲେ ଗୋରୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ
ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ।

► ଗୁରୁଳକ ତଳକୁ ଦିନରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥରେ ବୀ ବୁଝିଥର
ଫିନାଇଲ ପ୍ରଭୃତି ବିଶେଷାଧକ ପଦାର୍ଥରେ ସପା କରିବୁ ।

► ଗୋରୁ-ଗାଇଙ୍କୁ କଦାପି ଫିସି ହୋଇଥିବା ଦାନ
ଖୁଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

ବ୍ରିପ୍ତକମିଟେ ଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିଥୁଣେ...

ପଞ୍ଜମ ଧାନରେ ଥୋଡ଼ାସାର
ହିସାବରେ ହେଲୁଗ ପ୍ରତି ୧୦
କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର
ବର୍ଷା ଦେଖୁ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଧାନ
ରୂଆ ସରିଥିଲେ ପିଲିସାର ହିସାବରେ
ହେଲୁଗ ପ୍ରତି ୪୦ କେ.କ୍ର. ଯବକ୍ଷାରଜାନ
ସାର ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଚୁଣାଧାନରେ
ବେଉଷଣ ପରେ ହେଲୁଗ ପିଛା ୩୦
କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୩୦ କି.ଗ୍ରା.
ଫସଫରସ ଓ ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ପାରସ୍ ସାର
ପ୍ରଯୋଗକରି ବଜାବନ୍ତି ଓ ଖେଳୁଆ କାମ
ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଜଳସେଚନର ସୁରିଧା
ଥିବା ଜମିରେ ନଳିତା କଟାହେବା ପରେ
ସାଥିକ କିଥମ ଧାନ ଯଥା-ଖଣ୍ଡଗିରି,
ପାରିଗାତ, କଳିଙ୍ଗ-୩, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ,
ସହଭାଗୀ ଧାନ, ସିନାତ ଧାନତଳୀ
ରୂଥନ୍ତୁ । କାହାକିଆ ଓ କାଣ୍ଡବିଶା
ପୋକ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ତଳି ଗୋଲବା
ଦିନପାଇ ୧୫ ଦିନ ମରେ ଏକମେଳ

ରାଜ୍ୟ ଧାନ ଚାଷ କଣ୍ଟି



ପ୍ରୋମିଲି ବା ପ୍ରୋଫେନୋପ୍ସ ୪୦୦ ଟଙ୍କର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନକରନ୍ତୁ
ପିପ୍ରୋମିଲି ୦.୩ ଦାନାଦାର ବିଷ
କର ପ୍ରତି ୮ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ
ବିରେ ମଧ୍ୟାବୀ ବରାମଦାରେ।

ଡଳିଯାରେ ବୀଜାଶୁଭ୍ରତ ପଢ଼ୁଥୋଡ଼
ରୋଗ ହେଲେ ଷ୍ଟେପ୍‌ପ୍ରୋଟାଇଲ୍‌ଡିମ୍
୦.୦୧% (୧ ଗ୍ରାମକୁ ୧୦ ଲିଟର
ପାଣିରେ) କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚମାଲ୍‌ଏନ୍‌ଡି ୦.୧%
(୧ ଗ୍ରାମର ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ) ମନ୍ଦ

ଥୁଲ...
କପର ଅଞ୍ଚିକ୍ଷେରାଇଡ (୨.୫ ଗ୍ରାମ
୧ଲିଟର ପାଣିରେ) ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
। ଡିପଜମି ଧାନରେ ପଡ଼୍ରାଙ୍ଗାଦ ପୋଡ଼ି
ରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରୋପିକୋନାକୋଲ (୧
ମି.ଲି. ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ) ଗଲାଚ
ମୂଳତାଗରୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ମହିଷାରୋତ
ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲାକୋଲ
(୧ ଗ୍ରାମ/୧ ଲିଟର ପାଣିରେ) ବା
କାମୁକାମାଇସିନ୍ (୧.୫ ମି.ଲି. ୧
ଲିଟର ପାଣିରେ) ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
। ବିଳମ୍ବ ରୁଆ ଶେତ୍ରରେ ଘାସ ଦମନ
ପାଇଁ ଧାନ ରୁଆ ହେବାର ୩-୪ ଦିନ
ପରେ ହେବକର ପ୍ରତି ୩.୪ ଲିଟର ଶ୍ଵେତ
କିମ୍ବା ୧.୫ ଲିଟର ପ୍ରେରିନାକୋର କିମ୍ବା
ରୁଚାକୋରିରୁ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ
ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଉପରୋକ୍ତ
ଘାସମରା ଓଈଶଧରୁଡ଼ିରୁ ୪୦ କି.ଗ୍ରା.
ଶୁଖିଲା ବାଲିରେ ମିଶାଇ ଅଛୁ ଚଖାପାଣି
ରଖେ ମାତ୍ର ଲାଗି ଉପରେ ବରି ନିଆଇ

ପଦିପରିବ୍ରା ତଳି ପଟାଳିରେ ସାର ପୁଣ୍ୟଗ

ନିପରିବା ତଳି ପଚାଳିରେ
ସାର ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ
ତଳିପଟିକୁ ସ୍ଵଳ୍ପ ଜରି ଭାଙ୍ଗି
ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵ ନିବୁଜକରି ୨ ଦିନ

ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଳୋକ ଦ୍ଵାରା ଏହା
ବିଶୋଧତ ହୋଇଯାଏ । ତଳି ପଚାଳିକୁ
କାର୍ବେଣ୍ଟାଲିମ୍ ୨ ଗ୍ରାମରୁ ୧ ଲିଟର
ସ୍ଵରଶରେ ବିଶୋଧନ କରିଦେବା ଭଲ
କିମ୍ବା ୩-୪ ପ୍ରତିଶତ ପରାଲିନ୍ ସ୍ଵରଶ
ମିଶେବଳି ସବୁ ଉପରେ ଘୋହାରବାର

ଶୁଣ୍ଡମାଟି ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆନ୍ତୁ ଓ ନଡ଼ା କିମ୍ବା
ଶୁଣ୍ଡଲା ପାଳ ଘୋଡ଼ାଇଦେଲେ ଚଞ୍ଚଳ
ଗଜା ହୋଇଥାଏ । ମଞ୍ଜିଶୁଣ୍ଡିକ ଲଗାଇବା
ପୂର୍ବରୁ କିଲୋ ପ୍ରତି ୨ ଗ୍ରାମ ବାଜିଷ୍ଟିନ୍ ବା
୩ ଗ୍ରାମ ଥୁରାମ ମିଶାଇ ବିଶୋଧନକରି
ଲଗାନ୍ତୁ । ଫେରାରେ ପାଣି ଦିଆନ୍ତୁ ।
ଗାଣଖରା ଓ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ଛୋଟ ଚାରାକୁ

ରକ୍ଷାକରିବା ପାଇଁ ପଟାଳିକୁ ଜରିଗର
ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ । ବାଇଗଣା, ବିଲାଟି
ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା ଇତ୍ୟାଦି ଫ୍ରେଶର ଚାରା
ଉତ୍ତାରି ଲଗାଯାଉଥିବା ବେଳେ କଖାରୁ
ଜାତୀୟ ଫ୍ରେଶରୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳକ୍ଷ ମୂଳ
ଜମିରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ପନ୍ଦିପରିବା
ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୟରେ ତଳିଯା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା

ଲୁହ ପ୍ରଥମେ ମାଟିକୁ ଗୁଡ଼ିଚାଷ କରି ସେଥିରୁ
ଏ ଲଜା ଆଦି ବାନ୍ଧି ୧ ମି. ଓସାର, ୩ ମି.
ମୂ ୩ ୧୯-୧୫ ସେ.ମି. ଉଚତା ବିଶିଷ୍ଟ
ଲିଙ୍ଗରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ଲିଙ୍ଗରାଟେ
ଖୁଣ୍ଡି ଶଢା ଗୋବରଖତ ବା କମ୍ପୋକ୍ଷନ୍ତ୍ର
ଶ୍ଵରକରି ମିଶାଇ ଦିଆନ୍ତୁ । ଏଥୁସବୁ ୧୯୦
ମାନ୍ସୁପର ପଦ୍ମପେଣମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ



