



















# କପ୍ତଣପର ମତ୍ତା



ନିରାଞ୍ଜନ ସାହୁ

ଶ୍ରୀ ଶହର ବ୍ୟବସାଯିକ ଲାଭ ବୁଦ୍ଧବାରେ ମଣିଶ ଜାବନ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲାଛି।

ଶ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟଧ ଘାତକ, ତାହା ସିରପରେ କାହାରି ଦୁଷ୍ଟ ନ ରହିଲା ଭଲି ମନେହେଉଛି। ଡେତିଶାର ବିଶେଷକରି ସମଳପୁରୁଷ ବାରମାର ଜବତ ହେଉଥିବା କପ୍ତଣ ସିରପ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ମେ ୪ ତାରିଖରେ ସମଳପୁରୁଷ ପୋଲିସ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଖାନରୁ ୪,୦୧୮ ଟଙ୍କା କପ୍ତଣ ସିରପ ବୋତଳ ଜବତ କରିବା ସହ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରପ କରିଛି। ଏହାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ୪ ତାରିଖରେ ବରତଟ ପୋଲିସ ଟଙ୍କା କପ୍ତଣ ସିରପ ବୋତଳ ଜବତ କରି ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରପ କରିଥିଲା। ଏମାନେ ସମ୍ପେ ଉଚ୍ଚିଶାର। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତମବଜ୍ ହାତଦ୍ଵାରା ଏମାନେ କପ୍ତଣ ସିରପ ଆଶି ସମଳପୁରୁଷ ବିଭିନ୍ନ ଖାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମଳପୁରୁଷରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଣା ଦୁଇଁ ଅଠାତରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଲ ପିଲାମାଣଙ୍କ ରେ କପ୍ତଣ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଛି। ଟଙ୍କିତବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ୧୦ରେ ସମଳପୁରୁଷ ୧୭୮୭ ଟଙ୍କା ବୋତଳ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହା ସହ ୫ ଅଠାବର ହେବାର ଅଧିକ ଏବଂ ୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇାମାଣ ୧୨ ହଜାର କପ୍ତଣ ସିରପ ବୋତଳ ଜବତ ହେବା ବେଢ଼ିବକ ବେଆଇନ କାରବାରକୁ ଦୁଇଟି କରୁଛି। ଦେଖାବାକୁ ଗଲେ ସମଳପୁରୁଷ କପ୍ତଣ ସିରପ ପେଷ ପାଲିଟିଗଲାଣି। ଏବେ ସମଳପୁରୁଷ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋରାକୁ ଓ ଡ୍ରିପ୍‌ରେବେ କପ୍ତଣ ସିରପ ଜବତ ହେଉଛି। ବିନା ପ୍ରେସଟିପ୍‌ସନରେ ଏଥାବୁ ବିଭିନ୍ନ କାରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋରାରେ ଏହାକୁ ମାଦକ ବ୍ୟବ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶା ବ୍ୟବ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ କାରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଘଣା ଦୁଇଁ ଅଠାତରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଲ ପିଲାମାଣଙ୍କ ରେ କପ୍ତଣ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।

ଏବେ ଶୁଭ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ବିରଳ ରେକର୍ଡ କରୁଥିବା ବ୍ୟବ ଅଧିକାର ତମୋକ୍ରାଟ ଦଳର ସିନ୍ମର କୋରା ବ୍ୟବ – ସେ ବିନା ବାରାମାର ପରିଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରେ କରୁଛି ଆଶି ମାଦକ ବ୍ୟବ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ କାରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ଏବେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଠାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଘଣା ଦୁଇଁ ଅଠାତରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଲ ପିଲାମାଣଙ୍କ ରେ କପ୍ତଣ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।

ଏବେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଠାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଘଣା ଦୁଇଁ ଅଠାତରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଲ ପିଲାମାଣଙ୍କ ରେ କପ୍ତଣ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।

ଏବେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଠାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଘଣା ଦୁଇଁ ଅଠାତରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଲ ପିଲାମାଣଙ୍କ ରେ କପ୍ତଣ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।

ଏବେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଠାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଘଣା ଦୁଇଁ ଅଠାତରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଲ ପିଲାମାଣଙ୍କ ରେ କପ୍ତଣ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।

ଏବେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଠାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଘଣା ଦୁଇଁ ଅଠାତରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଲ ପିଲାମାଣଙ୍କ ରେ କପ୍ତଣ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।

ଏବେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଠାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଘଣା ଦୁଇଁ ଅଠାତରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଲ ପିଲାମାଣଙ୍କ ରେ କପ୍ତଣ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।

ଏବେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଠାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଘଣା ଦୁଇଁ ଅଠାତରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଲ ପିଲାମାଣଙ୍କ ରେ କପ୍ତଣ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।

ଏବେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଠାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଘଣା ଦୁଇଁ ଅଠାତରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଲ ପିଲାମାଣଙ୍କ ରେ କପ୍ତଣ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।

ଏବେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଠାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଘଣା ଦୁଇଁ ଅଠାତରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଲ ପିଲାମାଣଙ୍କ ରେ କପ୍ତଣ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।

ଏବେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଠାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଘଣା ଦୁଇଁ ଅଠାତରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଲ ପିଲାମାଣଙ୍କ ରେ କପ୍ତଣ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।

ଏବେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଠାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଘଣା ଦୁଇଁ ଅଠାତରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଲ ପିଲାମାଣଙ୍କ ରେ କପ୍ତଣ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।

ଏବେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଠାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଘଣା ଦୁଇଁ ଅଠାତରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଲ ପିଲାମାଣଙ୍କ ରେ କପ୍ତଣ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।

ଏବେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଠାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଘଣା ଦୁଇଁ ଅଠାତରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଲ ପିଲାମାଣଙ୍କ ରେ କପ୍ତଣ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।

ଏବେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଠାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଘଣା ଦୁଇଁ ଅଠାତରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଲ ପିଲାମାଣଙ୍କ ରେ କପ୍ତଣ ସିରପ ଜବତ ହୋଇଥିଲା।

ଏବେ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଠାର ମ



















# ରଜନୀଟିକାରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ

ଆଗରୁଲଗାୟାଇଥୁବା ରଜନୀଗନ୍ଧୀ ୩୦ଦିନର ହୋଇଯାଇଥୁଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୫୪କି.ଗ୍ରା. ଯବନ୍ଧାରଜାନ ସାର ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ରଜନୀଗନ୍ଧୀ ନ ଲଗାଇଥୁଲେ ଏହା ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଇପାରିବେ । କୋଲକାତା ସିଙ୍ଗଲ, ଶ୍ରୀଜ୍ଞାର, କୋଣାର୍କୁର ସିଙ୍ଗଲ ଓ ସୁହାସିନୀ(ଡରଲ) ଆଦି କିଷମତ ଲଗାନ୍ତୁ । ବୁଣିବା ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦିତ ସାରର (ଏକର ପ୍ରତି ୧୭୦କି.ଗ୍ରା. ଯବନ୍ଧାରଜାନ, ୮୦କି.ଗ୍ରା. ପଞ୍ଚପରସ୍ତ ଓ ୮୦କି.ଗ୍ରା. ପଚାସ ସାର)ର ସବୁତକ ପଞ୍ଚପରସ୍ତ ଓ ପଚାସ ସାର ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏକର ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୪୦, ୦୦୦କଟା ଆବଶ୍ୟକ । କନ୍ଦାଗୁଡ଼ିକ ୨୨.୪ସେ.ମି. ବ୍ୟାସ ବିଶ୍ଵିଷ୍ଟ ହୋଇଥୁବା ଦରକାର । ଶୀତଳ ଉତ୍ତରରେ ୪-୫ ଟିଙ୍କ୍ରୀ ସେଲ୍‌ବିଅର୍ବରେ ରହିଥିବା କନ୍ଦାଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଗଜା ହୋଇଥାଏ । ସତ୍ରଜାବପ୍ରବଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବ ଏକର ପ୍ରତି ୧୭୦କି.ଗ୍ରା. ନିମ୍ନ ପିଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।



## ଆଖୁରେ ପିଲି ବାହାରୁଥିଲେ...

ଆଖୁ ଫରସଲ ଲଗାଇବାର ୧୦୪ଦିନର ହୋଇଯାଇଥିଲେ  
କୋଡ଼ାଖୁସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଆନ୍ତୁ। ଏକର ପ୍ରତି ମଣକି.ଗ୍ରା  
ଯବନ୍ଧୀକାରଜାନ ଓ ୧୭କି.ଗ୍ରା। ପଚାଶ ସାର ପ୍ରୟେଗକରି ଛୁଡ଼ା  
କେକିଦିଆନ୍ତୁ। ବର୍ଷମାନ ଆଖୁରେ ପିଲ ବାହାରିବା ସମୟ।  
ତେଣୁ ପ୍ରତି ୧୦ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଜଳିବେଚନ କରନ୍ତୁ। ଗଛମୂଳ  
ଓଦା ରହିବା ଲାଗି ଶୁଖୁଲା ପତ୍ରଦ୍ଵାରା ନାଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆଛାଦ  
କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରାନ୍ତରରୁରେ ଜଳାଭାବରୁ ଫରସଲକୁ ରକ୍ଷାକରିବା  
ସକାଶେ ଶତକଡ଼ା ୪ ଭାଗ (୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୪୦ଗ୍ରାମ  
ହିସାବରେ ) ପଚାଶ ସାର ପତ୍ରିଆଶ କରନ୍ତୁ। ଶୁଖୁଲା  
ଆଖୁପତ୍ରକୁ ଗଛରୁ ଛଢାଇ ଦେଇ ଆଖୁ ଲଗାଇବାର ୪ ମାସ  
ହୋଇଥିଲେ ଭେଲା ବାନ୍ଧିବାକୁ ୨୫ାତିର ଆଖୁ ଗଛକୁ ଏକାଠି  
ଚାଣି ଭେଲା ବାନ୍ଧିଲେ ଆଖୁଗଛ ପବନରେ ପଢିଯାଏ ନାହିଁ।



# କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁଣୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ



ଡା. ବୀର କିଶୋର ପରିଷ୍ଠା

ପକାଇଥାଏ । ଫଳରେ ଥାଇରଣ୍ଡ  
ନିର୍ଗତ ହରମୋନ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୁବା  
ଆଶ୍ରେତିଅର ପିଣ୍ଡଗରି ଉପରେ ପ୍ରାତାବ  
ପଡ଼େ ଏହି ଏହା ଲିଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟଦର୍ଶତା  
ନିଯନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଗ୍ରୀଷ୍ମରତ୍ନରେ  
ଏପରିସର ଓ ଏଲ୍ଲାଖ ହରମୋନର  
ଅଭାବ ବେଖାଦେଇଥାଏ । ଏଥ୍ୟାଇଁ  
ଡିମାଣ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡରୁ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ।  
ଗରମଦିନରେ ରକ୍ତରେ ପ୍ରୋଲାଙ୍ଘି  
ହରମୋନ୍ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହାକି  
ହ୍ରାଇପୋଥାଳାମସରୁ ବାହାରୁଥିବା  
ଗୋନାତୋତ୍ରପିନ୍ ହରମୋନ୍ ଝରଣରେ  
ବାଧା ମୁଣ୍ଡକରେ । ଫଳରେ ଗାଈ  
ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତି ଅପ୍ଲାଯୀ ଭାବେ ହରାଇ  
ଦେବି ।

“ଖାଦ୍ୟକେ ପ୍ରକଣ୍ଠ ଖାବା ବା ଗରମରୁ ରକ୍ଷାପାଇବା ପାଇଁ ଗୋରୁଙ୍କ ଗୁହଳ ବା ଫାର୍ମ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଗଛ ଯଥା - ସୁବାବୁଲୁ, ନିମ୍ବ, କଷ୍ଟଚନ୍ଦ୍ରା, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଗଛ ଲାଗି ଛାଇ ସ୍ଵର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚ୍ଚିତ । ଗୁହଳେ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଇଳ ପାଇଁ ପ୍ରଶନ୍ତ ହରକା ବିପରାତମୁଖୀ ଦିଗରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।”



ପ୍ରଯେବେଶନକରି ଗରମ ଗାଇର ଲକ୍ଷଣ  
ଜାଣି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହେ ଏହାର ନିର୍ଣ୍ଣତ  
ଲାଳ ପରାଯା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କୃତ୍ତିମ  
ପ୍ରଜନନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ନିର୍ମିତ ଗରମ  
ଚିହ୍ନଟ ପରିଚି ଏବଂ କୃତ୍ତିମ ପ୍ରଜନନ ଦିନ  
ଓ ରାତିର ଥଣ୍ଡା ପ୍ରହରରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାତିକାଳ  
ବା ଦିଲ୍ଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା  
ଉଚିତ । ଗରମ ହେବାର ଠିକ୍ ସମୟରେ  
କୃତ୍ତିମ ପ୍ରଜନନ ବା ଗରମ ଲକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ  
ହେବାର ୧୨ ରୁ ୧୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ  
ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଶୁଣି ଶୁଣାକୁ ଦ୍ୱାରା କୃତ୍ତିମ ପ୍ରଜନନ  
କରାଇନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରଜନନ  
ପରେ ଗାଇକୁ ଧାରେ ସୁଲ୍ଲେ ଘରକୁ ନେବା  
ଏବଂ ଗାଇକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ  
ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ତୁଳା ଶତାବ୍ଦୀରୁ  
ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।  
ଗୋରୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା  
ସାଧାରଣତଃ ଖରାଦିନେ ସବୁଜ ଘାସର  
ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ।

[View details](#)



➤ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ । ଚାଷରେ ରୋଗ ଓ ପୋକ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସମ୍ବିଦ୍ଧ ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ପରିଷତ୍ତି ଅବଳମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ୪୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିକୁ ଘାସମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ । ମାଟିର ବତର ଦେଖୁ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ।

➤ ମୁଗା, ବିରି ପାଇଁ ହେବୁର ପ୍ରତି ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବନ୍ଧାରଜାନ୍, ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସଫେର୍ ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ପଶାସ ଏବଂ ମଟର ପାଇଁ ୨୪ କି.ଗ୍ରା. ଯବନ୍ଧାରଜାନ୍, ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସଫେର୍ ୩ ୨୪ କି.ଗ୍ରା. ପଶାସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଜଉପୋକ ଲାଗିଲେ ହେବୁର ପିଛା ରୋଗର ୧ ଲିଟର କିମ୍ବା ଜଣିଆଲ୍‌କ୍ଲୋପ୍‌ର୍‌ ୧୭.୮ ଏସ.୧୬୮. ୧୨୦ ମି.ଲି.ମ୍ଲ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପାଉଁଶୀଆ ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ହେବୁର ପିଛା ୨ କି.ଗ୍ରା. ସେତିତି ଗନ୍ଧ ବା ସଲଫେନ୍‌ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

►ଚିନ୍ମାବାଦମ ବୁଣୀବାର ୨/୩ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଳକୁ ଖୁଲ୍ଲାଇ ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଜିପୁଷ୍ଟ ବୁଣୀବା ସମୟରେ ଦିଆଯାଇ ନ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ହେବକୁ ପ୍ରତି ୨୫୦ କି.ଗ୍ରା. ଜିପୁଷ୍ଟମଙ୍କୁ ୨ପାଖରେ ଦେଇ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ୧୨ ରୁ ୧୪ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ବଡ଼ର ଦେଖି ପାଣି ମଦାନ୍ତୁ । ଲାଲ ଶାରୀରିକୁ ପାଇଁ ତେଜିଲ ମିଳା । କିମ୍ବା ଉଲାଇକ ରା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରୋପ ମିଳେ ଲାଗନ୍ତି ।

ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହାରୁ ଜ୍ଞାନାବ୍ୟୁଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଏଥିମ ବାରକୁ ।  
➤ ସୋରିଷ ଗାନ୍ଧି କନ୍ଦୁଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ଜଳପ୍ରେଚନ କରନ୍ତୁ । ଜଞ୍ଜପୋକ

A photograph showing a vast field of flowering mustard plants. The plants are tall with long green stems and numerous small, bright yellow flowers. The field stretches to a distant, hilly horizon under a clear sky.



A photograph showing a group of brown, irregularly shaped tubers, possibly yams or sweet potatoes, arranged in a pile. The tubers have a rough, textured surface with some white spots.

## ତୁଳାଧିପାନରେ କାଣ୍ଡିଛା | ପୋକ ଦମନ

ଲୁଆଧାନରେ କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକ  
ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ହେବୁର  
ପ୍ରତି ୧୯.୪ କି.ଗ୍ରା. ପିପୋଳିଲ୍, ୦.୩  
ଦାନାଦାର ବିଷ ଅଛୁ ପାଣି ରଖୁ ପ୍ରୟୋଗ  
କରନ୍ତୁ ଅଥବା ୧ ଲି. କ୍ଲୋରୋପାଇଟିଫ୍ସ୍‌  
୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ  
କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରୋଡ଼ା ଗୋର ଦମନ ପାଇଁ  
ହେବୁର ପ୍ରତି ୪୦ ଗ୍ରାମ ଶ୍ରେଣ୍ୟେସାଇଲିନ୍  
ଓ ୧୨୪୦ ଗ୍ରାମ ଗ୍ଲୋଜକ୍ଷେ-୪୦ ସେଟିତ  
ମୁଣ୍ଡକୁ ୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ  
ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ୨ ମହିନା ଗୋର ଦମନ  
ପାଇଁ ହେବୁର ପ୍ରତି ୩୦୦ ଗ୍ରାମ ବା ୦.୭  
ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାଜବାଇକ୍ଲାନୋଲ୍କୁ ପ୍ରତି ଲିଟର  
ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଡାକୁଆ  
ଧାନରେ ମାଣ୍ଡାଗୁଡ଼ି ପୋକ ଆକ୍ରମଣ  
ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମ୍ବନ୍ଧି ଥାଏ । ଏହି ପୋକ  
ଲାଗିଲେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥିଲେ



- ପ୍ରଥମେ ଜମିରୁ ପାଣି ନିଷାସନ କରି  
  ୧/୨ ଦିନ ଶୁଖଲା ରଖି ପୁଣି ବିଳା  
  ପାଣି ମଡ଼ନ୍ତୁବ୍ରା ବୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ୮-୧୦

ପୋକ ଲାଗିଲେ ଫେନୋବୁକାର୍ବ ୧ ଲିଟର  
ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ବା ଛଥୋଫେନସ୍ପ୍ରେକସ୍  
୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ହିସାବରେ  
ଗୋଲାଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରି  
ପ୍ରତି ବୁଦ୍ଧାରେ ୨/୩ ଟି ବୁଝି  
ଥୁଲେ ପୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବି ୧

## ଯତ୍ନ ଗୋଟାଦ୍ୟ ପଂସଳ

ବର୍ଷମାନ ସମୟରେ ମକା ଓ ବରଗୁଡ଼ିର ମିଶ୍ରିତ ଫ୍ରେଶ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଜ  
ଗୋଖାଦ୍ୟ ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ । ଶେଷଓଡ଼ି ଚାଷରେ ଏକର ପ୍ରତି ୪ଙ୍ଗାଢ଼ି  
ସତ୍ତା ଗୋବର ଖତ, ୪୦କି.ଗ୍ରା. ଯବକ୍ଷାରଙ୍ଗାନ, ୪୦କି.ଗ୍ରା. ଫ୍ରେଶ୍ପର୍ଯ୍ୟ  
ଓ ୪୦କି.ଗ୍ରା. ପଚାର ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲାଙ୍ଘିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ  
ଥିଲେ ଶେଷ ଓଡ଼ି ଚାଷରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦କି.ଗ୍ରା. ଶତକତା ୧.୪ଭାଗ  
କ୍ଲୋରୋପାଇରିପ୍ରସ୍ତ୍ର ଗୁଣ ପ୍ରୟୋଗକରି ଭଲଭାବେ ଦିଶାକ ଦିଆନ୍ତୁ  
ମକାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିହନ କିମ୍ବା ହେଲା ଆପ୍ରିକାନ୍ ଗଲ୍ ଓ ବରଗୁଡ଼ିର  
ଲେଷି ୪୨୧୬ । ମିଶ୍ରିତ ଫ୍ରେଶ୍ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୪୦କି.ଗ୍ରା. ମକା  
ବିହନ ଓ ୨୦କି.ଗ୍ରା. ବରଗୁଡ଼ି ବିହନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଜମି  
ପ୍ରମୁଦ୍ର ହେଲା ପରେ ବିଆର ପଛରେ ପ୍ରତି ୨ଧାଢ଼ି ମକା ପରେ ୨ଧାଢ଼ି  
ବରଗୁଡ଼ି ବୁଣନ୍ତୁ । ବୁଣିବା ପରେ ଜମିରେ ହାଲୁକା ଜଳିଷେତନ କରନ୍ତୁ



