



କ୍ରି ପଟ୍ଟାଳିରେ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ

ପନ୍ଥିପରିବା ତଳି ପଶକିଲେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ତଳିପଟିକୁ ସ୍ଵର୍ଗ ଜରି ଡାଙ୍କି ଚତୁର୍ଥାର୍ଥ ନିବୁଜ କରି ଦୁଇ ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଳୋକ ଦ୍ଵାରା ଏହା ବିଶୋଧତ ହୋଇଯାଏ । ତଳି ପଶକିଲୁ କାର୍ବେଞ୍ଚାଜିମ୍ ୨ୟାମତ୍ତୁ ୧ ଲିଟର ଦ୍ରୁଷ୍ଟରେ ବିଶୋଧନ କରିଦେବା ଭଲ କିମ୍ବା ୩-୪ ପ୍ରତିଶତ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଦ୍ରୁଷ୍ଟ ସିଞ୍ଚନ କରି ସ୍ଵର୍ଗ ଜରିରେ ଘୋଡ଼େଇବାର ୪-୫ ଦିନ ପରେ ବିହନ ବୁଣ୍ଟୁ । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତ ତଳି ପଶକି ଉପରେ ଶୁଖଲା ଘାସ ରଖୁ ପେଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ବିଶୋଧନ ହୋଇଥାଏ । ତଳିପାରା ପାଣି ନିର୍ମିତ ଯିବା ପାଇଁ ପଶକି ମଞ୍ଚରେ ନାଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ତଳିପାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପରେ ମାଟିରେ ୨ ଲଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗାର ଗାଣି ମଞ୍ଜିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣ୍ଟୁ । ତା' ଉପରେ ଶୁଖଲା ଗଣ୍ଠାମାଟି ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତ ଓ ନନ୍ଦା କିମ୍ବା ଶୁଖଲା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ

ବଞ୍ଚିଲ ଗଜା ହୋଇଥାଏ । ମଞ୍ଜି ରୁଡ଼ିକ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଳୋପ୍ରତି ୨ ଗ୍ରାମ ବଢ଼ିଷ୍ଟି ବା ନ ଗ୍ରାମ ଥରାମ ମିଶାଇ ବିଶ୍ଵାଧନ କରି ଲଗାନ୍ତୁ । ଖରାରେ ପାଣି ଦିଆନ୍ତୁ । ଶାଖଗରା ଓ ବର୍ଷାଦାଉରୁ ଛୋଟ ବାରାନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଟଳିକୁ ଜରି ଘର ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ । ବାଇଗଣଶ, ବିଲାତି ବାଇଗଣଶ, ଲଙ୍କା ଇତ୍ୟାଦି ଫ୍ରେଶଲର ବାରା ଉତ୍ତାରି ଲଗାଯାଉଥିବା ବେଳେ କହାନ୍ତିରୁ ଜାତୀୟ ଫ୍ରେଶଲରୁ ସିଧାସନଖ୍ୟା ମୂଳ ଜମିରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ପନିପରିବା ବାଷ ସମାଯରେ ତଳିଗରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥେମେ ମାରିକୁ ରୁଣ୍ଡ କାଷ କରି ସେଥିରୁ ଘାସ ଲଟା ଆଦି ବାନ୍ଧି ୧ ମି. ଓସାର, ୩ ମି. ଲମ୍ଫ ଓ ୧୨-୧୪ ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ତଳିଗରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ତଳିଗରାରେ ୪ ରୁଡ଼ି ଶତା ଗୋବର ଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟନ୍ତୁ ରୁଣ୍ଡ କରି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏଥସହିତ ୧୪୦ ଗ୍ରାମ ସପର ଫ୍ରେଶଲର ମଧ୍ୟ ପାନ୍ଦେଗ କରନ୍ତୁ ।



ସମନ୍ବିତ ପୋକ ପରିଚାଳନା

ବାଇଗଣରେ ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡବିଦ୍ଧା ପୋକର ଦମନ ଲାଗି ସମନ୍ତିତ ପୋକ ପରିଚାଳନା ପଢ଼ିଥିଲୁ ଅନୁସାରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦,୦୦୦ଟଙ୍କାରେ କାଣ୍ଡବିଦ୍ଧାମା ପରାଶ୍ରୀୟ ଜୀବ ଛାଡ଼ିବିଲୁ କିମ୍ବା ୩୦୦ଟଙ୍କାରେ କାଣ୍ଡବିଦ୍ଧାମା ନିମିଜ୍ଜାତ ଜୀବନାଶକଙ୍କୁ ଏକର ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ହିସାବରେ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ଗ୍ରାମ କାର୍ବାଟିଲ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କଖାରୁ ଜାତୀୟ ଫ୍ରେଶଲରେ ଲାଲ ଓ କଳା କଖାରୁ ଭୁଙ୍ଗ ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦୦ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କାର୍ବାଟିଲ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଲଙ୍କାମରିତ ଫ୍ରେଶଲରେ ପତ୍ରମୋଟା ଦେଖାଗଲେ ଏହାର ଦମନ ସକାଶେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି ଆବାମେକ୍ଷିତ(୧.୫%) କିମ୍ବା ୧.୪ରୁ ୨ ମିଲି ଇଥୁଅନ୍ତରେ ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଖୁବଜ୍ଞ ଫ୍ରେଶଲରେ ଜଉପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଗଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦ମିଲି ଜୀବିତାକୋପ୍ରିତ୍ ୨୦୦ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଉଦିନ ପରେ ଫ୍ରେଶଲ ଅମଳ କରନ୍ତୁ।

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମଳକ୍ଷମ ଚିନାବାଦାମ ପାଇଁ...

ଚିନାବାଦାମ ଜମିରୁ ପାଣି କାଟି ଦିଅଛୁ । କାଗଣ ଏହି ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଲେ
ତେର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପାଏ ନାହିଁ । ତେରର ଭାବୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ
ଭଲ ବାଦାମ ଧରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଜମିରୁ ଜଳ ନିଷାଏନ ନିଶାତି କରିବା ଦରକାର
ଚିକାରୋଗ ପାଇଁ ମାଙ୍କୋଜେବ୍ (୩ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ)
କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋଆଲୋନିଲ୍ (୭ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ) ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ମୂଳଶତ୍ରା ଗୋଗ ଲାଗିଲେ ମେଟାଲାକ୍ସିଲ୍ ସହ ମାଙ୍କୋଜେବ୍ରୁ ୨ ଗ୍ରାମ
ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଚିନାବାଦାମ ଫଟଲରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ବର୍ଷା କମ୍ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତର ଲାଗିଥିଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର
ପାଣିରେ ୪ ମି.ଲି. ହିସାବରେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫ୍ସ ୨୦ ଲୀ.ସି. ମିଶାଇ
ଗଛ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି କି ମାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚପରିବ



କାଣ୍ଡି ରଖନ୍ତୁ

➤ ଗୁହାଳ ତଳ ଓଦା ରଖିବୁ ନାହିଁ । ଓଦା ରହିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଗୋପନୀ
ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ଗୁହାଳ ତଳକୁ ଶୁଷ୍ଠିଲା ରଖିବା ପାଇଁ ପାଉଁ
ବା ବାଲି ବିଛାନ୍ତୁ । ଗୋ-ମହିଷ୍ଟ ଓ ବନ୍ଧୁଚିତ୍ତ ସାହାରଣ
ବଜରଜିଆ ଗୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ଏହି ସଂକ୍ରାମଣ
ଗୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଦିଅନ୍ତୁ
ଗୋଗ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଣି ଚିକିତ୍ସକ
ପରାମର୍ଶ

ନିଆକୁ ।
➤ ଗୋ-ମହିଷିଙ୍କ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ କୁର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଅଧିକ ତାତି ରହେ ଓ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ ଦେଖି ଉପେ ଏହି ବନ୍ଦର ଜମଶବ୍ଦ ମାଠୁଁ ଲାଗିଥାଏ ।

ଗୋଡ଼ ଦେଖି ରାଜତ ଏହି ପ୍ରକଟ ଅପରାଧ ଦୀର୍ଘ ତାତ୍କାଳିକ
ପରାମର୍ଶରେ ଉପସଥି ଝୁଆନ୍ତି ।

➤ ଗୁହାଳସବୁବେଳେ ପରିଷା ରାତ୍ରିଶୁକ୍ଲାରଖାନ୍ତି । ଏହାରଗାତିପାଦ
ଉଚା ଓ ନିରିଢ଼ି କରନ୍ତୁ ନଚେତ ପାଣି ଜନି ସତସତିଆ ହେଲେ
ଗୋରୁଙ୍ଗ ଦିନର ସଂକ୍ଷାମକ ରୋଗ ହେବାର ଆଶକ୍ତା ଥାଏ ।


➤ ଗୁହାଳର ତଳକୁ ଦିନରେ ଅନ୍ତରେ ଥିଲେ ବା ଦୁଇଥର ଫିନାଇଲ
ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ପାଇଁ ।

▶ ପ୍ରଭୃତି ବିଶୋଧକ ପଦାର୍ଥରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ।

10.10

ମୁଖ୍ୟ କିଞ୍ଚିତ୍ ପାଇଁ

ମଧ୍ୟ କିସମ ଧାନର ୪୦-୫୦ଦିନିଆ ତଳି ରୁଆୟାଇପାରିବା । ବୁଦାପ୍ରତି ୪ରୁ ୫ଟି ତଳି ଓ ବର୍ଗମିଚର ପ୍ରତି ୪୦ଟି ବୁଦା ଧାତିରେ ରୁଆନ୍ତୁ । ବିଲମ୍ବ କିସମ ଧାନର ୩୦-୩୦ଦିନିଆ ଧାନ ତଳି ରୁଆୟାଇପାରିବା । ବୁଦା ପ୍ରତି ୪ରୁ ଏଟି ତଳି ଓ ବର୍ଗମିଚର ପ୍ରତି ୪୪ଟି ବୁଦା ଧାତିରେ ରୁଆନ୍ତୁ । ଏକର ପ୍ରତି ଅଧିକ ୧୦କ୍ରି.ଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଯେଉଁ ଖାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେତୁ ଫସଳ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି ସେଠି ଅନ୍ୟ ଖାନରୁ ତଳି ସଂଗ୍ରହ କରି ରୁଆ କାମ କରନ୍ତୁ । ତଳି ନ ମିଳିଲେ ରୁଆ ତଳି ପକାନ୍ତୁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗର୍ଭୁମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଲଗାୟାଇପାରିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ସେଫ୍ଟ୍‌ମ୍ୟୁର ଏୟାର୍‌ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାୟାଇପାରିବ । ତେଣୁ ମଧ୍ୟ କିସମ ଜମିପାଇଁ ୧୦୦ଦିନିଆ କିସମ ଯଥା ଅନ୍ଧଦା, ଖଣ୍ଡଗିରି, ପାରିଜାତ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ କିସମ ଜମି ପାଇଁ ୧୨୦ ଏବଂ -୧୩୦ଦିନିଆ କିସମ ଯଥା-ଲଲାଟ, ସୁରେତ୍ର ଆଦି କିସମ ସଂଗ୍ରହ କରି କାନ୍ଦୁଆ ତଳି ଘରାରେ ଧାନ ଗଜା କରି ତଳି ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ୧୫ଦିନପରେ ତଳି ରୁଆନ୍ତୁ । ତଳି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନରେ ପଥେଷ ପାଇସନ୍ତାରେ ପାଇଁ ବିଅଳା



ଆଖି ଚାଷରେ କାଣ୍ଡରିକ୍ତ ପୋକ ଦମନ -

ଆ ଶୁଣି ଗାଷ କରାଯାଇଥିବା ଜମିରେ ଜଳ
ନିଷାସନର ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ । ଫଲାଲ
ନ-୪ ମାସର ହୋଇଥିଲେ ଭେଳାବନ୍ଦା
କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରନ୍ତୁ । ସାଥଳ କାଷବିନ୍ଦା
ପୋକର ଦମନ ଲାଗି ଅଗ୍ରାଧୁକାରରେ ଜେବ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଢ଼ନ୍ତି (ଏକର ପିଛା ୪୦,୦୦୦
ଗ୍ରାଙ୍କକୋଡ଼ମ୍ବା ଜାପୋକମ) ଅବଳମ୍ବନ କରନ୍ତୁ
କିମ୍ବା ହେବୁର ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପିପ୍ରେନିଲ୍
୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଅଗବିନ୍ଦା ପୋକ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ଦମନ
ପାଇଁ ହେବୁର ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପିପ୍ରେନିଲ୍
କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫେନୋଫେନ୍ କିମ୍ବା ୪୦୦ ଲିଟର
ପାଣିରେ ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ଏସିଫେନ୍ ମିଶାଇ
ହିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ସୁବିଧା ଥିଲେ, ପତ୍ର କହାରେ
ବାଗାଠ ଶୀଘ୍ର ପାରେ ହୋଇପାରେ ।

