



କ୍ରି ପଟ୍ଟାଳିରେ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ

ପନ୍ଥିପରିବା ତଳି ପଶକିଲେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ତଳିପଟିକୁ ସ୍ଵର୍ଗ ଜରି ଡାଙ୍କି ଚତୁର୍ଥାର୍ଥ ନିବୁଜ କରି ଦୁଇ ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଳୋକ ଦ୍ଵାରା ଏହା ବିଶୋଧତ ହୋଇଯାଏ । ତଳି ପଶକିଲୁ କାର୍ବେଞ୍ଚାଜିମ୍ ୨ୟାମତ୍ତୁ ୧ ଲିଟର ଦ୍ରୁଷ୍ଟରେ ବିଶୋଧନ କରିଦେବା ଭଲ କିମ୍ବା ୩-୪ ପ୍ରତିଶତ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଦ୍ରୁଷ୍ଟ ସିଞ୍ଚନ କରି ସ୍ଵର୍ଗ ଜରିରେ ଘୋଡ଼େଇବାର ୪-୫ ଦିନ ପରେ ବିହନ ବୁଣ୍ଟୁ । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତ ତଳି ପଶକି ଉପରେ ଶୁଖଲା ଘାସ ରଖୁ ପେଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ବିଶୋଧନ ହୋଇଥାଏ । ତଳିପାରା ପାଣି ନିର୍ମିତ ଯିବା ପାଇଁ ପଶକି ମଞ୍ଚରେ ନାଲିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ତଳିପାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପରେ ମାଟିରେ ୨ ଲଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗାର ଗାଣି ମଞ୍ଜିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣ୍ଟୁ । ତା' ଉପରେ ଶୁଖଲା ଗଣ୍ଠାମାଟି ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତ ଓ ନନ୍ଦା କିମ୍ବା ଶୁଖଲା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ

ବଞ୍ଚିଲ ଗଜା ହୋଇଥାଏ । ମଞ୍ଜି ରୁଡ଼ିକ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଳୋପ୍ରତି ୨ ଗ୍ରାମ ବଢ଼ିଷ୍ଟି ବା ନ ଗ୍ରାମ ଥରାମ ମିଶାଇ ବିଶ୍ଵାଧନ କରି ଲଗାନ୍ତୁ । ଖରାରେ ପାଣି ଦିଆନ୍ତୁ । ଶାଖଗରା ଓ ବର୍ଷାଦାଉରୁ ଛୋଟ ବାରାନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଟଳିକୁ ଜରି ଘର ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ । ବାଇଗଣଶ, ବିଲାତି ବାଇଗଣଶ, ଲଙ୍କା ଇତ୍ୟାଦି ଫ୍ରେଶଲର ବାରା ଉତ୍ତାରି ଲଗାଯାଉଥିବା ବେଳେ କହାନ୍ତିର ଜାତୀୟ ପସଲଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ମୂଳ ଜମିରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ପନିପରିବା ବାଷ ସମାଯରେ ତଳିଗରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥେମ ମାରିକୁ ରୁଣ୍ଡ କାଷ କରି ସେଥିରୁ ଘାସ ଲଟା ଆଦି ବାଛି ୧ ମି. ଓସାର, ୩ ମି. ଲମ୍ବ ୨୦-୧୫ ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ତଳିଗରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ତଳିଗରାରେ ୪ ରୁଡ଼ି ଶତା ଗୋବର ଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟରୁ ରୁଣ୍ଡ କରି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତେ । ଏଥସହିତ ୧୫୦ ଗ୍ରାମ ସପର ଫ୍ରେଶଲ ମଧ୍ୟ ପାନୋଗ କରନ୍ତୁ ।



ସମନ୍ବିତ ପୋକ ପରିଚାଳନା

ବାଇଗଣରେ ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡବିଦ୍ଧା ପୋକର ଦମନ ଲାଗି ସମନ୍ତିତ ପୋକ ପରିଚାଳନା ପଢ଼ିଥିଲୁ ଅନୁସାରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦,୦୦୦ଟଙ୍କାରେ କାଣ୍ଡବିଦ୍ଧାମା ପରାଶ୍ରୀୟ ଜୀବ ଛାଡ଼ିବିଲୁ କିମ୍ବା ୩୦୦ଟଙ୍କାରେ କାଣ୍ଡବିଦ୍ଧାମା ନିମିଜ୍ଜାତ ଜୀବନାଶକଙ୍କୁ ଏକର ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ହିସାବରେ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଅଥବା ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ଗ୍ରାମ କାର୍ବାଟିଲ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କଖାରୁ ଜାତୀୟ ଫ୍ରେଶଲରେ ଲାଲ ଓ କଳା କଖାରୁ ଭୁଙ୍ଗ ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦୦ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କାର୍ବାଟିଲ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଲଙ୍କାମରିତ ଫ୍ରେଶଲରେ ପତ୍ରମୋଟା ଦେଖାଗଲେ ଏହାର ଦମନ ସକାଶେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି ଆବାମେକ୍ଷିତ(୧.୫%) କିମ୍ବା ୧.୪ରୁ ୨ ମିଲି ଇଥୁଅନ୍ତରେ ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଖୁବଜ୍ଞ ଫ୍ରେଶଲରେ ଜଉପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଗଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦ମିଲି ଜୀବିତାକୋପ୍ରିତ୍ ୨୦୦ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଉଦିନ ପରେ ଫ୍ରେଶଲ ଅମଳ କରନ୍ତୁ।

ଅଧୁକ ଅମଳକମ ଟିନାବାଦାମ ପାଇଁ...

ଚିନାବାଦାମ ଜମିରୁ ପାଣି କାଟି ଦିଅଛୁ । କାଗଣ ଏହି ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିଲେ
ତେର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପାଏ ନାହିଁ । ତେରର ଭାବୁଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ
ଭଲ ବାଦାମ ଧରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଜମିରୁ ଜଳ ନିଷାଏନ ନିଶାତି କରିବା ଦରକାର
ଚିକାରୋଗ ପାଇଁ ମାଙ୍କୋଜେବ୍ (୩ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ)
କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋଆଲୋନିଲ୍ (୭ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ) ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ମୂଳଶତ୍ରା ଗୋଗ ଲାଗିଲେ ମେଟାଲାକ୍ସିଲ୍ ସହ ମାଙ୍କୋଜେବ୍ରୁ ୨ ଗ୍ରାମ
ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଚିନାବାଦାମ ଫଟଲରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ବର୍ଷା କମ୍ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଠ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର
ପାଣିରେ ୪ ମି.ଲି. ହିସାବରେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫ୍ସ ୨୦ ଲୀ.ସି. ମିଶାଇ
ଗଛ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି କି ମାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚପରିବ



ହାତି ରଖନ୍ତ

➤ ମୁହାଳ ତଳ ଓଦା ରଖିଛୁ ନାହିଁ । ଓଦା ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ମୁହାଳ ତଳକୁ ଶୁଣୁଳା ରଖିବା ପାଇଁ ପାଇଁବା ବା ବାଲି ବିଶ୍ଵାସ କୁ । ଗୋ-ମହିଷି ଓ ବାନ୍ଧିରିଲୁ ସାହାଗା ବଜାଇଅଛିଆ ଗୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧାମାନ ଗୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଚିକା ଦିଆଯାଇଲୁ ଗୋଗ ଦେଖାଗଲେ ଭରନ୍ତ ପାଣୀ ଚିକିତ୍ସାକୁ ପରାମର୍ଶ

▶ گو-مہیشیلු අදෙල දින්නා කුර හේලේ වෙමනු
දෙහරේ අදුක තැටි රහේ ව ආක්‍රාක ප්‍රාග් । گොඩී

ଗୋଡ଼ କେତ ରଖେ । ଏହି ବ୍ରତର ଉପଶମ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆଶୀର୍ବଦ ଖୁଲ୍ଲାଇଛନ୍ତି ।

➤ ମୁହାଳିକୁ ସୁରୂ ବେଳେ ପରିଷାର ଓ ଶୁଣ୍ଠିଲାଗନ୍ତୁ । ଏହାର ଗରିପାଇ ଉଚା ଓ ମିଳିତା କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ପାଣି ଜଣି ସନ୍ଧିଷ୍ଟିଆ ହେଲେ ଗୋରୁଙ୍କୁ କିମ୍ବିନ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ।


➤ ମୁହାଳିକ ତଳକୁ ଦିନରେ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ବା ଦୁଇତର ପିନାଇଲାଙ୍କାରେ ପରିଷାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶରେ ଆଶୀର୍ବଦ ଖୁଲ୍ଲାଇଛନ୍ତି ।

▶ ପ୍ରଭୃତି ବିଶୋଧକ ପଦାର୍ଥରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ।

www.10000000.com

ମୁଖ୍ୟ କିଞ୍ଚିତ୍ ପାଇଁ

ମଧ୍ୟ କିସମ ଧାନର ୪୦-୫୦ଦିନିଆ ତଳି ରୁଆୟାଇପାରିବା ବୁଦାପ୍ରତି ୪ରୁ ୫ଟି ତଳି ଓ ବର୍ଗମିଚର ପ୍ରତି ୪୦ଟି ବୁଦା ଧାଡ଼ିରେ ରୁଅନ୍ତୁ । ବିଳମ୍ବ କିସମ ଧାନର ୩୦-୩୦ଦିନିଆ ଧାନ ତଳି ରୁଆୟାଇପାରିବା ବୁଦା ପ୍ରତି ୪ରୁ ଏଟି ତଳି ଓ ବର୍ଗମିଚର ପ୍ରତି ୪୪ଟି ବୁଦା ଧାଡ଼ିରେ ରୁଅନ୍ତୁ । ଏକର ପ୍ରତି ଅଧିକ ୧୦ଙ୍କୁ ଯଦିକ୍ଷାରକାଜନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଯେଉଁ ଖାନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲୁ ଫସଳ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି ସେଠି ଅନ୍ୟ ଖାନରୁ ତଳି ସଂଗ୍ରହ କରି ରୁଆ କାମ କରନ୍ତୁ । ତଳି ନ ମିଳିଲେ ରୁଆ ତଳି ପକାନ୍ତୁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗଣ୍ୟମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଲଗାୟାଇପାରିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ସେବେମ୍ବର ୧୫ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାୟାଇପାରିବ । ତେଣୁ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଜମିପାଇଁ ୧୦୦ଦିନିଆ କିସମ ଯଥା ଅନ୍ଧଦା, ଖଣ୍ଡିରି, ପାରିଜାତ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ କିସମ ଜମି ପାଇଁ ୧୨୦ ଏବଂ - ୧୩୦ଦିନିଆ କିସମ ଯଥା - ଲଲାଟ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆଦି କିସମ ସଂଗ୍ରହ କରି କାତୁଆ ତଳି ଘରାରେ ଧାନ ଗଜା କରି ତଳି ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ୧୫ଦିନ ପରେ ତଳି ରୁଅନ୍ତୁ । ତଳି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପିଗାରେ ମଥେଷ ମରଣାରାଜ ମାର ନିଆଇବା



ଆଖି କାଷରେ କାଣ୍ଡରିତ୍ବ ପୋକ ଦମନ୍ -

ଆ ଶୁଣି ଗାନ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ଜମିରେ ଜଳ
ନିଷାସନର ସୁଖିଧା କରନ୍ତୁ । ଫର୍ମଲ
ଣ-୪ ମାସର ହୋଇଥିଲେ ଭେଳାବନ୍ଧା
କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରନ୍ତୁ । ସଥଳ କାନ୍ତିବନ୍ଧା
ପୋକର ଦମନ ଲାଗି ଅଗ୍ରାଧିକାରରେ ଜେବ
ନିୟମନ୍ତ୍ରଣ ପଢ଼ିବି (ଏକର ପିଛା ୪୦,୦୦୦
ଗ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଜାପୋକମ୍) ଅବଳମ୍ବନ କରନ୍ତୁ
କିମ୍ବା ହେଲ୍କର ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପିପ୍ରେନିଲ୍
୪୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଅଗବିନ୍ଦା ପୋକ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଦମନ
ପାଇଁ ହେଲ୍କର ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପିପ୍ରେନିଲ୍
କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫେନୋପ୍ସ କିମ୍ବା ୪୦୦ ଲିଟର
ପାଣିରେ ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ଏସିଫେଟ୍ ମିଶାଇ
ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ସୁଖିଧା ଥିଲେ, ପତ୍ର କନ୍ଧାରେ
ନାମାନାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟେ ଜରାମାରାନେ ।

